

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- El producto es nocivo por ingestión y por contacto con la piel.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Piretroide.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático. En caso de intoxicación severa, la terapia debe incluir sedantes y anticonvulsivos

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106 AGRO INGENIUM S.A.C.: 992-773-871

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos y semiacuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva

# CYPMOR 25 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

Cipermetrina..... 250 g/L.  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L.

**Reg. N° 946-2000-AG-SENASA**

**TITULAR DE REGISTRO: AGRO INGENIUM S.A.C.**

RUC: 20601259673  
 Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú  
 Tel.: 992-773-871

**FORMULADO POR: Agrimor IL LTD ISRAEL**

20 Korchak St. Herzeliya, Tel Aviv, ISRAEL  
 +972-99581196

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Solandina Perú S.A.C.**

Dirección: Av. Benavides N° 2975 Of. 902  
 Urb. A. Von Humbolt, Miraflores, Lima - PERÚ  
 Tel.: +51 960241693

Fecha de formulación:  
 N° de lote:  
 Contenido neto: 500 ml.  
 Fecha de Vencimiento:



**NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Cypmor 25 EC, es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. No es tóxico para el hombre, controla diversas especies de insectos, picadores chupadores y matadores.

**MODO DE EMPLEO:**

El producto puede aplicarse con bombas de mochila a palanca o motorizado o con equipos motorizados de alta capacidad, así como en aplicaciones aéreas. En todo caso debe haber buena cobertura de aplicación.

El volumen de agua recomendado para equipos de aplicación terrestres, fluctúa entre 400 a 800 litros por Ha, dependiendo de la densidad y desarrollo vegetativo del cultivo.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Algodón	Arrebiatado	Dysdercus peruvianus	0.2	14	0.05
	Gusano rosado	Pectinophora gossypiella	0.2	14	0.05
Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.2	14	0.05
Pijol	Barredor de brotes	Crociosema aporema	0.15	14	0.2
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.15	14	0.05
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	14	0.1

P.C.: Período de carencia en días

L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

