

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No debe comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Irritante de piel y ojos.
- Altamente tóxico para abejas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: PIRETROIDES
En caso de ingestión provocar el vómito y llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, alejarlo de la zona de contaminada y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicite atención medica inmediata.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Antes de desechar el envase de CYPMOR, realice el triple lavado del envase. Para ello llene el envase hasta un tercio de su capacidad con agua, agite bien en todas direcciones por 30 segundos y vacíe este líquido en el cilindro o mochila. Escurra muy bien. Repita este procedimiento 3 veces.
- Inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para ese fin.

En caso de emergencia, llamar:

CICOTOX: 328-7398

EsSalud 472-2300 (Lima)

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos
- No aplicar en época de floración
- Nocivo para la fauna benéfica
- Peligroso para los peces y crustáceos. No contaminar los lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o xsobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación de 5m. hacia fuentes de agua
- Peligrosos para animales domésticos, fauna benéfica y flora silvestre
- No permitir animales en el área tratada
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Cypmor 25 EC

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Cipermetrina 250 g/L

Aditivos csp 1 L

Reg.N° 946-2000-AG-SENASA

Formulador:

Agrimor IL Co.

23 Fl, Rihaobldg, Baoan South RD,
Shenzhen, China

Titular del Registro:

STOCKTON PERU SAC

Urb. Ciudad del Pescador Mz. P-3 Lt. 20
Bellavista - Callao - PERÚ

Importado y Distribuido por:

PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC

Av. Nicolas Arriola 2374 Urb. El Pino

Lima-Lima - San Luis

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Expiración:

Contenido Neto: 5 L.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Cypmor 25 EC, es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. No es tiene un amplio espectro de acción, controla diversas especies de insectos, picadores chupadores y matadores.

FORMA DE APLICACIÓN

El producto puede aplicarse con bombas de mochila a palanca o motorizado o con equipos motorizados de alta capacidad, así como en aplicaciones aéreas. En todo caso debe haber buena cobertura de aplicación.

El volumen de agua recomendado para equipos de aplicación terrestres, fluctúa entre 400 a 800 litros por Ha, dependiendo de la densidad y desarrollo vegetativo del cultivo.

USOS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	DOSIS ml/cil 200L	P.C. días	L.M.R. ppm
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200	14	0.05
	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	200		
Papa	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200	14	0.05
Frijol	Perforador de brotes	<i>Epinotia aporema</i>	150	14	0.1
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	150	14	0.05

P.C.: Período de carencia en días.

L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Según la plaga en el cultivo y las recomendaciones del Ingeniero Agrónomo.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

NO ES FITOTOXICO A LAS DOSIS RECOMENDADAS

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con aquellos de marcada reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: STOCKTON PERÚ SAC garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

