

**LEÍDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS***

INDICACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

• No beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
• Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• No usar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
• No usar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
• No usar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
• No usar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

• No usar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
• No usar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
• No usar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
• No usar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

AUXILIOS

• En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle el envase.

• En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle el envase.

• En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle el envase.

• En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle el envase.

• En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle el envase.

• En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle el envase.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040

DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• No usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de
• No usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de
• No usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de



PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

• No usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de
• No usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de
• No usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de

• No usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de



Cypmor 25 EC

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**INSECTICIDA AGRICOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

Composición:

Cipermetrina 250 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg.N° 946-2000-AG-SENASA

Fabricado y Formulado por:
Agrimor IL. LTD - China
23 FL. RIHAO BLDG, BAOAN
SOUTH RD,
Tel: 0086-755-82480398

Títular del Registro:
JEBSEN & JESSEN PERU SAC
AV. DE LA FLORESTA N° 497
SAN BORJA - LIMA - PERU

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Solandina Perú SAC.
Tel.: +51960241693
Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902
Urb. A. Von Humboldt - MIRAFLORES
LIMA - PERÚ



Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Expiración:
Contenido Neto: 5 L.



NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Cypmor 25 EC, es un insecticida piretroides que actúa por contacto e ingestión. No es tóxico para el hombre, controla diversas especies de insectos, picadores, chupadores y matadores.

FORMA DE APLICACIÓN

El producto puede aplicarse con bombas de mochila a palanca o motorizado o con equipos motorizados de alta capacidad, así como en aplicaciones aéreas. En todo caso debe haber buena cobertura de aplicación. El volumen de agua recomendado para equipos de aplicación terrestres, fluctúa entre 400 a 800 litros por Ha, dependiendo de la densidad y desarrollo vegetativo del cultivo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	DOSIS ml/veil 200L	P.C. días	L.M.R. ppm
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200	14	0.05
	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	200		
Papa	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200	14	0.05
Frijol	Barranador de brotes	<i>Crocidosoma aporema</i>	150	14	0.2
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	150	14	0.05
Maiz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200	14	0.1

P.C.: Período de carencia en días.
L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Según la plaga en el cultivo y las recomendaciones del Ingeniero Agrónomo.

PERÍODO DE REINGRESO
No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD
NO ES FITOTOXICO A LAS DOSIS RECOMENDADAS

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con aquellos de marcada reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: STOCKTON PERÚ SAC garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

