

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

# CYPMOR 25 EC

**PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

Cipermetrina..... 250 g/L.  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L.

**Reg. N° 946-2000-AG-SENASA**

**TITULAR DE REGISTRO: AGRO INGENIUM S.A.C.**

RUC: 20601259673

Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú

Tel.: 992-773-871

**FORMULADO POR: Agrimor IL. LTD**

23 FL, RIHAO BLDG, BAOAN SOUTH RD, China

Tel: 0086-755-82480398

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Solandina Perú S.A.C.**

Dirección: Av. Benavides N° 2975 Of. 902

Urb. A. Von Humbolt, Miraflores, Lima - PERÚ

Tel.: +51 960241693



Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 10 Litros

Fecha de Vencimiento:



**NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Cypmor 25 EC, es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. No es tiene un amplio espectro de acción, controla diversas especies de insectos, picadores chupadores y matadores.

**FORMA DE APLICACIÓN**

El producto puede aplicarse con bombas de mochila a palanca o motorizado o con equipos motorizados de alta capacidad, así como en aplicaciones aéreas. En todo caso debe haber buena cobertura de aplicación.

El volumen de agua recomendado para equipos de aplicación terrestres, fluctúa entre 400 a 800 litros por Ha, dependiendo de la densidad y desarrollo vegetativo del cultivo.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Algodón	Arébiatado	Dysdercus peruvianus	0.2	14	0.05
	Gusano rosado	Pectinophora gossypiella	0.2	14	0.05
Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.2	14	0.05
Frijol	Barredor de brotes	Crociosema aporema	0.15	14	0.2
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.15	14	0.05
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	14	0.1

P.C.: Período de carencia en días L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Algodón: Se recomienda maximo 2 aplicaciones por campaña al año, en desarrollo vegetativo.

Papa: Se recomienda maximo 2 aplicaciones por campaña al año, en desarrollo vegetativo.

Frijol: Se recomienda maximo 3 aplicaciones por campaña al año, en desarrollo vegetativo.

Cebolla: Se recomienda maximo 3 aplicaciones por campaña al año, en desarrollo vegetativo.

Maíz: Se recomienda maximo 2 aplicaciones por campaña al año, en desarrollo vegetativo.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con aquellos de marcada reacción alcalina

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA