

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUPRIMER 50 WG es un fungicida con propiedades protectantes, curativas, erradicantes y sistémicas.

Es absorbido por las raíces y trasladado por el xilema a los tallos y hojas, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial en el hongo. Inhibe la germinación de las esporas, crecimiento del micelio y la producción de esporas del hongo.

SUPRIMER 50 WG puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre, usando suficiente cantidad de mezcla para asegurar un buen cubrimiento del cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Enfermedad		Dosis		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	g/ Ha	Kg/200L		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	200	-	7	5
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	200	-	14	2
Mandarina	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	-	0.025-0.05	N.D	15

PC: Periodo de carencia.

LMR: Límite máximo de residuos.

N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar las aplicaciones de manera preventiva o en los estadios iniciales del desarrollo de la enfermedad. No realizar más de 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SUPRIMER 50 WG es compatible con la mayoría de los Plaguicidas de uso común. Se recomienda elaborar una pre-mezcla en pequeña escala para estudiar compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD

SUPRIMER 50 WG no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si de usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

