

11.0 ± 0.3 cm

0.5 ± 0.2

0.5 ± 0.2

16.0 ± 0.3 cm

2.4 cm

NEOSULFURON[®]

750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Nicosulfuron 750 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 2034 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
 NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
 Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 50 g

N° de Lote:
 F. de Form.:
 F. de Venc.:

Formulado por:
HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE CO. LTD.
 Room 1606, Unit 3, Building 3, Wanda Commercial Center,
 No. 666, Hangxing Road, Gongshu District, Hangzhou,
 China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sulfonilurea
- No tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NEOSULFURON[®] 750 WG es un herbicida selectivo post-emergente, para el control de gramíneas anuales en el cultivo de maíz. NEOSULFURON[®] 750 WG es absorbido foliar y radicalmente, y rápidamente transportados por la planta, tanto vía xilema como floema, acumulándose en los meristemas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, alternando las aplicaciones con herbicidas de diferentes modos de acción.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328-7700 ESSALUD: 411-8000

(opción 4)

CISPROQUIM: 0800-50847

NEOAGRUM S.A.C.: 617-6400

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Pega pega Chamico Cadillo Pata de gallina Gramma	Boerhavia caribaea Datura stramonium Cenchrus echinatus Eleusine indica Leptochloa uninervia	0.04 - 0.05	60	0.01

P.C.: Período de Carenia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

