

11.0 ± 0.3 cm

0.5 ± 0.2

0.5 ± 0.2

NEOSULFURON® 750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Nicosulfuron 750 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 2034 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 50 g

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
**HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL
CHEMICAL CO., LTD.**
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,
Zhejiang Province, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sulfonylurea
- No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NEOSULFURON® 750 WG es un herbicida selectivo post-emergente, para el control de gramíneas anuales en el cultivo de maíz. **NEOSULFURON® 750 WG** es absorbido foliar y radicalmente, y rápidamente transportados por la planta, tanto vía xilema como floema, acumulándose en los meristemas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, alternando las aplicaciones con herbicidas de diferentes modos de acción.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328-7700 ESSALUD: 411-8000
(opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847
NEOAGRUM S.A.C.: 617-6400

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Pega pega Chamico Cadillo Pata de gallina Gramá	<i>Boerhavia caribaea</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Leptochloa uninervis</i>	0.04 - 0.05	60	0.01

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos



16.0 ± 0.3 cm

2.4 cm