

16.5 cm

21.0 cm

COMPATIBILIDAD:
NEOSULFURON® 750 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
NEOSULFURON® 750 WG no es fitotóxico para el cultivo recomendado si se usa según lo indicado en la etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS:
No tiene efectos sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS:
No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

MÉTODO DE APLICACIÓN:
Aspersión dirigida al follaje de las plantas tratadas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:
Emplear cualquier equipo convencional terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

PERIODO DE REINGRESO:
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Pega pega	<i>Boerhavia caribaea</i>	0.04 - 0.05	60	0.01
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Grama	<i>Leptochloa uninervis</i>			

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

NEOSULFURON®
750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:
Nicosulfuron 750 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 2034 - SENASA
Titular del Registro: NEOAGRUM S.A.C.

Nombre común : Nicosulfuron
Nombre químico : 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoil)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide



Fórmula empírica : C₁₅H₁₈N₆O₆S
Peso molecular : 410.41 g/mol
Grupo químico : Sulfonylurea

Propiedades físicas y químicas
Apariencia : Gránulos marrón claro
pH : 5.0 - 8.0
Densidad : 0.5 - 0.7 g/mL

Importado y Distribuido por:
neoagrum
Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Formulado por:
**HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL
CHEMICAL CO., LTD.**
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou.
Zhejiang Province. China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

- LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
- “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Sulfonylurea**
- No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328-7700
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847
NEOAGRUM S.A.C.: 617-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEOSULFURON® 750 WG es un herbicida selectivo post-emergente, para el control de gramíneas anuales en el cultivo de maíz.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

NEOSULFURON® 750 WG es absorbido foliar y radicalmente, y rápidamente transportados por la planta, tanto vía xilema como floema, acumulándose en los meristemas. **NEOSULFURON® 750 WG** actúa impidiendo la reacción enzimática de la acetolactato sintasa, lo que altera la síntesis de los aminoácidos esenciales isoleucina, leucina y valina y detiene la división celular y el crecimiento de la planta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, alternando las aplicaciones con herbicidas de diferentes modos de acción.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

