

Amalfi[®] 73

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AMALFI 73 muestra actividad fungicida principalmente sobre los Peronosporales de los géneros Phytophthora, Peronospora y Bremia. El componente principal del AMALFI 73, el benalaxil puede ser absorbido por las yemas, hojas, tallos herbáceos y raíces de las plantas perennes y anuales.

AMALFI 73 actúa en el interior de los diversos órganos vegetales. Además de ser eficaz contra los órganos de multiplicación del patógeno en el exterior del vegetal, AMALFI 73 penetra por los tejidos epidérmicos, se mueve a través de las paredes celulares y es transportado vía xilema a todo el vegetal, llegando y protegiendo a las zonas no alcanzadas directamente por el producto o las que se formen después del tratamiento.

FORMA DE APLICACIÓN

Mezclar el producto con la mitad del agua a utilizar a las dosis indicadas en el cuadro de usos y dosis, agite, complete el agua y vuelva a agitar.

Realizar una aplicación con gotas finas y cobertura uniforme, durante las horas de menor viento y de preferencia en horas de la tarde.

Amalfi[®] 73

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - PM

Composición:

Benalaxil 80 g/Kg
Mancozeb 650 g/Kg
Aditivos 270 g/Kg

Reg. PQUA Nº 015 - SENASA

Importado y Distribuido por:



Contenido Neto: 200 g

Formulado por:

FMC

FMC Corporation Agricultural Products Group
Via Felice, Casati 20-Milano, Italia.
Bajo patente de :
FMC Corporation Agricultural Products Group
Philadelphia, Pennsylvania, USA

Titular del Registro

**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.**

Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Telef.: 710-4000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar los tratamientos cuando las condiciones sean favorables para la infección y repetir con los intervalos después de una evaluación, considerando las condiciones ambientales existentes y el grado de infección.

PERIODO DE REINGRESO

Evitar ingresar 1 a 2 días después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

AMALFI 73 es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común, sin embargo estos últimos se debe añadir a la mezcla inmediatamente antes de tratar.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no fumar ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y no ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No usar el envase vacío para conservar alimentos o agua potable.
- Revisar bien los equipos de aspersión antes de la aplicación para evitar fugas o goteo que puedan producir intoxicación en el aplicador.
- El producto no puede ser usado por personas que mantengan tratamiento para la epilepsia, especialmente fenobarbital.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No puede ser empleado en ambientes cerrados, como invernaderos.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de tiroides o estén bajo tratamiento de afecciones tiroideas.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Ditiocarbamato, Acylalanine
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
Contradicciones: Alcohol, aceites y grasas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	1 - 2	28	0.02
Lechuga	Mildiu	<i>Bremia lactucae</i>	1,5 - 2	28	1
Papa	Hielo o Ranza	<i>Phytophthora infestans</i>	2 - 3	28	0.02
Tomate	Hielo o Ranza	<i>Phytophthora infestans</i>	2 - 3	28	0.2

P.C. Periodo de Carenia.

L.M.R. Limite Máximo de Residuos.

NOTA AL MÉDICO

El antídoto es desconocido. Aplicar terapia sintomática. Se recomienda que en caso de uso prolongado y continuo, efectuar evaluación de tiroides.

Teléfonos de emergencia:

Infosalud: 0800-10-828

EsSalud: 411-8000 (Anexo 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar a menos de 1-2 m de fuentes de agua.

