

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para inutilizar y destruir los envases:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



Cultivo	Enfermedad		Dosis L/ha	PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.6 - 0.8	35	0.01* 0.1**

*Kresoxim methyl **Epoiconazole
PC: Período de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

COD.

En caso de derrames: se puede absorber con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Frecuencia y época de aplicación:
Se recomienda realizar una aplicación de **BALLESTA** por campaña, para un máximo de 0.8 L/ha.

Mecanismo de acción: **BALLESTA** que inhibe el transporte de electrones en la mitocondria de los hongos. Además de inhibir la síntesis de ergosterol de los hongos.

Modo de acción: **BALLESTA**, es un fungicida a base de Kresoxim methyl y Epoiconazole. Kresoxim methyl es un fungicida traslaminar que es inicialmente mantenido sobre o dentro de la cutícula de cera de la superficie de las plantas. Epoiconazole es un fungicida que tiene acción sistémico, protectante, curativo y erradicante.

Compatibilidad: **BALLESTA** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Método de aplicación: **BALLESTA** se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre como bomba de mochila manual.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de aplicado el producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas".

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

BALLESTA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Grupo Químico: Estrobilurina + Triazole


SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Reg. PQUA N° - SENASA

NOMBRE COMÚN (ISO):
Kresoxim methyl.....125 g/L
Epoiconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 Litro

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):
Kresoxim methyl: methyl-(E)-methoximino [2-(o-tolylloxymethyl) phenyl]acetate
Epoiconazole: (2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole

FÓRMULA ESTRUCTURAL



FÓRMULA MOLECULAR Y EMPÍRICA:

C₁₆H₁₆NO, 313.4 (Kresoxim methyl)
C₁₇H₁₅ClFN₃O, 329.8 (Epoiconazole)



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico : Líquido
- Color : Blanquecino
- Olor : Característico de la sustancia

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Capacidad	Material
100 ml	Frascos PEAD y PET, galoneras, bidones de polietileno de alta densidad Y cilindros (plásticos y metálicos).
250 ml	
500 ml	
1 litro	
4 litros	
5 litros	
10 litros	
20 litros	
200 litros	

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991 piso 9
Magdalena del Mar Lima - Perú.
Teléfono: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.
N°58 Nanhu Road, Nanjing, China
Telf.: 86 25 86455985

ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt. B y Sub lote Parcela 64, Lt.B. Lurigancho - Chosica - Lima

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para conservar bebidas ni alimentos.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:

Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta de protección.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones: Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sus envases originales, sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No almacene en casa de habitación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido: En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.

Instrucciones si el producto ha sido inhalado: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

En caso de Emergencias llamar a CICOTOX Telf.: 0800-13040 ó ESSALUD Telf.: 0801-10200 ó DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 501-1000

- **NOTA AL MEDICO:** Tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

