



20.5 x 28 cms

CARIAL FLEX

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Gránulos Dispersables - WG

Composición

Cymoxanil. 180 g/kg
Mandipropamid 250 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

PQUA N° 1972 –SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú
Manuel Olguín 335 Of. 808
Urb. Los Granados - Santiago de Surco

Importado y Distribuido por:

FARMAGRO 

Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos - Lima
Tel: 614-1500 Fax : 614-1517; 614-1516
RUC: 20100180210

Formulado por:

Syngenta Production France S.A.S.
Francia

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

CONTENIDO NETO

500 g

®

syngenta®



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

CF 10 17



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es Dañino. No ingerir.
- Evita contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evitar contacto con la piel y la ropa con este producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Oxima cianoacetamida / Mandelamidas
- En caso de Ingestión: Llame al médico inmediatamente. No induzca al vomito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzados contaminados. Bañese con abundante agua y jabon.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No hay antídoto especificado. Tratamiento sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

- CICOTOX: 0800-13040
- ESSALUD: 411 8000 anexo 4, infosalud: 0800-10-828.
- CISPPOUIM: 0800-50-847

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Realizar como máximo cuatro aplicaciones por campaña/año.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **CARIAL FLEX** es un fungicida preventivo de acción translaminar y sistémico, usado para el control de hongos Oomicetos.
- Para la preparación, verter la cantidad de **CARIAL FLEX** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.
- **CARIAL FLEX** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Plaga		Dosis g/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	"Rancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	500	20	0.01*/ 0.05**
Cebolla	"Mildu"	<i>Peronospora destructor</i>	600	7	0.05*/ 0.05**
Tomate	"Rancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	500 - 600	3	*0.3 / **0.2

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón

* Mandipropamid / **Cymoxanil

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Aplicar **CARIAL FLEX** un máximo de 4 veces por campaña/año para papa y 2 veces por campaña/año para cebolla, con un intervalo de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- **CARIAL FLEX** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD

- Siempre que **CARIAL FLEX** se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en papa a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

