

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino si se ingiere
- No ingerir ni entrar en contacto con ojos, piel y ropa
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo fresco, seco y ventilado
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento .

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico : DITIOCARBAMATO
En caso de intoxicación o ingestión lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta
En caso de ingestión no provocar el vómito si esta conciente dar de beber abundante agua.
- En caso de contacto con la piel. Quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón
- En caso de contacto con los ojos lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos.
Inhalación Retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: No tiene antídoto específico. Realizar el lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de sotén
Teléfonos de emergencia

CICOTOX: Tel 0 800 13040 (Atención 24 horas)
EsSalud en línea 0801- 10200 (Gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- Peligroso para los peces y crustáceos. No contaminar los lagos ,ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua , de al menos 5 metros.
- Peligrosos para animales domésticos, fauna benéfica y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

MORIZEB 80 WP , es un fungicida a base de Mancozeb usado para prevenir el ataque de los hongos que causan enfermedades. Actúa por contacto, inhibiendo los grupos sulfídricos (SH) de los aminoácidos, proteínas y enzimas de las células de los patógenos.

MORIZEB 80 WP, se aplica previo riego al campo de aplicación. Las aplicaciones se realizan con equipos de aspersión terrestre. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente para determinar el gasto de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Kg/ha	PC Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIÉNTIFICO			
Papa	“Hielo” o “Rancha”	<i>Phytophthora infestans</i>	2 - 3	7	NA
Tomate	“Mancha foliar”	<i>Alternaria solani</i>	2	7	4
Ajo cebolla	“Mildiu” “Podrición gris”	<i>Peronospora destructor</i> <i>Botrytis cinerea</i>	2 - 3	7	0.5
Arroz	“Pyricularia”	<i>Pyricularia oryzae</i>	2	14	NA
Melón	“Mildiu”	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2	5	4.0
Esparrago	“Cercosporiosis”	<i>Cercospora asparagi</i>	1.5 - 2	NA	0.1
Paprika	“Podrición de flores y frutos”	<i>Botritis cinerea</i>	1.5 - 2	7	1

P.C.: Período de carencia en días.

L.M.R.: Limite máximo de residuos en p.p.m.

NA: No aplica

Las dosis mínimas corresponde a aplicaciones preventivas en plantas tiernas.
En plantas desarrollas y cuando la presión de la enfermedad es alta, usar las dosis altas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un riego antes de la aplicación

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña / año.

Las aplicaciones pueden repetirse entre los 7 y 14 días.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

MORIZEB 80 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con aquellos de reacción alcalina o fuertemente alcalina. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

