

9.8 +/- 0.1 cm

14.6 +/- 0.1 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido mulde la funda o bolsa conteniendo. Entreguela o deposítela en el lugar de desecho dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los derechos de aplicación.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escurrimiento por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva y recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto bajo llave, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No permitir que el transportador conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni bebés.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lívelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y lávelo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la mucosa, lávela con abundante agua contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-4400

GLADIADOR PLUS 700 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición: 700 g/kg
Activos: Acelamiprid c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2065-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogram

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-4400

Contenido neto: 1 kg
N° de Lot.:
F de Hom.:
F de Valg.:
Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing, China.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
GLADIADOR PLUS® 700 WG es un insecticida con modo de acción de amplio espectro que presenta una actividad translaminar y sistémica, actuando por contacto e ingestión. El ingrediente activo, Acelamiprid, ejerce su mecanismo de acción interfiriendo con la transmisión del estímulo en el sistema nervioso del insecto.

GLADIADOR PLUS® 700 WG se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final. Campesinado con agua limpia y volverlo resqueado, aplicarlo sobre una planta hospedera. Usar agua limpia de pH 6.7. Aplicar en suelos húmedos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Nombre Común	PLAGA	Nombre Científico	DOSIS kg/200L (dias)	P.C. L.M.R.
Atridano	Mosca blanca	Bemisia tabaci		0.05	1
	Pojo Harinoso	Pseudococcus longispinus		0.05 - 0.075	2
Espárrago	Mosca blanca	Aleurodicus jalkine		0.05 - 0.1	1
	Mosquilla de los brotes	Prodidictus longella		0.075 - 0.1	1
Fresa	Thrips	Thrips tabaci		0.05 - 0.1	14
	Cochinilla harinosa	Planococcus ficus		0.075 - 0.1	90
Limón	Minador de la hoja	Phyllocolpa citrella		0.03 - 0.05	14
	Queresa coma	Lepidosaphes beckii		0.1	1
Mango	Queresa del mango	Milvotulus morphene		0.05 - 0.07	1
	Queresa	Forpita forpiae		0.05 - 0.07	14
Vid	Cochinilla harinosa	Planococcus ficus		0.05 - 0.1	14
				0.05 - 0.1	0.9

P.C.: Período de carencia
L.M.R.: Límite máximo de residuos
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar como máximo 1 aplicación por campaña/lotío en los cultivos de espárrago, fresa, granado, limón, mandarina, mango, palto y vid; para el cultivo de atridano realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña/lotío, considerando 1 campaña al año, previa evaluación y cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la plaga. Dosis máxima de aplicación por campaña es de 0.3 kg/ha.

PERÍODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso de requerir ingresar al campo antes de cumplido el periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: GLADIADOR PLUS® 700 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas, ácidos fuertes y materiales alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es apto para los usos autorizados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones e instrucciones de seguridad. Se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

