

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de CUIDADO. No Ingerir.

Causa irritación moderada a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

Utilice ropa protectora (mascarilla, lentes protectores, overol, guantes y botas) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUIMICO: TRIAZOLE.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

Antídoto: No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX tel.: 0800-1-3040

ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

SUNNY® 5 SC

Regulador de Crecimiento de Plantas de Uso Agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Uniconazole-P 50 g/L

Aditivos Csp 1 L

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Formulado por:



ADAMA Agan Ltd.

Northern Industrial Zone, P.O.B. 262, Ashdod 77102

Israel

Titular de registro, Importador y Distribuidor:

SMTM PERU S.A.C

Av. República de Panamá 3531. Int. 1203. San Isidro.

Teléfono: 01 4214811

Lima - Perú

Contenido neto: 1 Lt.

Lote

Fecha de Fabricación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUNNY 5 SC es un regulador de crecimiento de plantas utilizado para disminuir el crecimiento vegetativo, mejorar la calidad del fruto e incrementar el rendimiento por un aumento en el cuajado de los frutos de paltos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar antes de usar. Vaciar la dosis de **SUNNY 5 SC** en un balde con agua y agitarlo; vaciar la solución en un cilindro, completar con agua hasta el volumen deseado agitando constantemente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

Cultivo	Dosis (L/cil. 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
Palto	1 - 2	NA	0.02

N.A: No Aplica.

MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar antes o durante la fase de floración con brotes de 5 – 10 cm. No aplicar en la etapa de fructificación o presencia de fruto. La frecuencia de aplicación es de 1 aplicación/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 24 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Compatible con surfactantes organosiliconado. Se recomienda no aplicar con ningún plaguicida.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

