

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Compuestos de Cobre

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consiente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos, incluso los párpados.
- En caso de inhalación lleva al paciente a un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a **CISPROQUIM:** 0800-50847, **ESSALUD** en línea (línea gratuita): 0801-10200 o 411-8000 (Opción 4) y **CAISAC:** 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Kobrex

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN:

Sulfato de Cobre Pentahidratado 247g/L
Aditivos..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 2116 - SENASA

Titular de Registro, Formulator y Distribuidor:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

Contenido Neto: 10L

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KOBREX®, es un fungicida de acción sistémica, que actúa sobre la desnaturalización no específica de proteínas, enzimas peroxidadas y pared celular de los hongos. Su acción también afecta la germinación de las esporas.

KOBREX® se diluye en agua y luego se aplica usando equipos convencionales de aspersión foliar como: bomba de mochila manual y a motor, pulverizadores mecanizados, etc. También puede ser utilizado vía drench o fertirriego para proteger el sistema radicular del ataque de los patógenos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/cilindro	L/ha		
Palto	Pudrición	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.4 - 0.5	2.0 - 2.5	14	20
Espárrago	Fusariosis del espárrago	<i>fusarium oxysporum f.sp. asparagi</i>	0.75-1.0	1.5 - 2.0	3	5
Arándano	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.8 - 1.0	1.6 - 2.0	N.A.	N.A.
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	-	21	50

LMR: Límite Máximo de Residuos N.A.: No aplica PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo.

Realizar máximo dos aplicaciones de campaña, considerando 1 campaña/año.

Dosis máxima 2.5 L/ha (Gasto de agua 5 cilindros máximo).

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

KOBREX® es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas, excepto con los agentes oxidantes fuertes y sustancias muy ácidas. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

KOBREX® no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Banda Amarilla: Amarillo Pantone C