

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Neonicotinoide

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua, inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continúa, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado a persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira, aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico.

Nota al médico

Antídoto: este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800 - 13040

ESSALUD: 4116000 - ANEXO 4.

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.: 01 222-2795

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/Ha	kg/200L		
PIMIENTO	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.20		3	7
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>		0.08	21	0.4

P.C.: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CAMPO-XAM 25 WG es un insecticida del grupo químico NEONICOTINOIDE de acción sistémica y actúa por contacto e ingestión.

Aplicar el producto mediante aspersión directa sobre el follaje de las plantas con una bomba de fumigar de mochila manual.

Calcule la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie a proteger.

Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua, adicione CAMPO-XAM 25 WG de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Agregue el resto de agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en la fase decrecimiento vegetativo y/o fructificación.

Realizar una sola aplicación por campaña

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 12 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No se conoce incompatibilidad alguna, se recomienda hacer pruebas en campo para nuevas mezclas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CAMPO-XAM

25 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA - WG

Composición:

Thiamethoxam 250 g/Kg

Aditivos csp. 1Kg

Reg. PQUA N° 1907 - SENASA

Titular de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.

Av. Los Mirtos 239. Lince 14. Perú

Teléfono: +51-1-222-2795

Fabricado y Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street, Ningbo

315010, Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: +86-574-87301088

Importado y Distribuido por:

SANIVEG PERU S.A.C.

Av. San Jenaro 235 - Urb. Industrial Puente Piedra -

Puente Piedra - Lima - Perú.

Teléfono: + 51 - 1 - 016371269

Celular: + 51 - 959292596

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

Contenido Neto: 5 KG

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



GENERIC
your exclusive agrochemical partner


SANIVEG PERU
SAC