

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla o aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, bajo condiciones de 10-24°C, en lugar ventilado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa, y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningún envase de plaguicida se debe utilizar para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No ingerir.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación retirar al afectado de la zona de peligro, y llame al médico inmediatamente y muéstrela etiqueta.
 - En caso de ingestión inducir al vómito, si continua mareos, conducir al paciente al centro de salud más cercano, llevando la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, y bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada hacia un lugar ventilado.
- Antídoto: no tiene antídoto específico, tratar según síntomas.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, GAP DEL PERU: (01)2460452

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia campos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No permitir animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe cumplir todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames recoger el producto, inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Valery Plus

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Trichoderma harzianum.....2.3 x 10⁹ UFC/g.....60 g/kg
Trichoderma viride.....2.3 x 10⁹ UFC/g.....60g/kg
Aditivos..... c.s.p..... 1.0 kg

Reg. N° 030 SENASA - PBA - ACBM

Titular de Registro: Gap del Perú S.R.L.
Jr. Manuel Pardo N° 490
Lima – Lima – Lima
Teléfono: 01 2460 452

Formulador y distribuidor: Gap del Perú S.R.L.
Jr. Manuel Pardo N° 490
Lima – Lima – Lima
Teléfono: 01 2460 452

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 1 Kg
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: VALERY PLUS se recomienda aplicar al inicio de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo de la enfermedad, preferiblemente de forma preventiva, antes de que la enfermedad se presente. Es recomendable aplicar de preferencia en horas de la mañana y tarde, mediante aspersiones foliares dirigidas con buena nebulización. VALERY PLUS es un fungicida biológico formulado a base de esporas en estado latente del hongo Trichoderma harzianum y Trichoderma viride. VALERY PLUS actúa por micoparasitismo, antibiosis y competencia contra microorganismos fitopatógenos. Por lo cual la aplicación realizar dirigida hacia la parte donde está afectada por la enfermedad. **Preparación y aplicación:** Adicionar agua al tanque del equipo de aplicación hasta ¾ parte de volumen requerido. Agregue lentamente la cantidad de VALERY PLUS requerida por tanque. Luego complete el volumen de agua. El producto debe ser conservado en su envase original. Bajo condiciones ambientales presenta una estabilidad de almacenamiento de 7 meses. Bajo condiciones de refrigeración a 4°C presenta una estabilidad de almacenamiento de 12 meses.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis Kg / ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 1.0	N.A.	N.A.
Palto	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cada 21 días. Se recomienda realizar hasta 3 aplicaciones por campaña, alternando las aplicaciones con fungicidas de otro mecanismo de acción. Palto: realizar 1 aplicación, durante la antesis e inicio de cuajado y cuando la población de la plaga sea moderada, el gasto de agua es 1000 L/ha.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada hasta transcurridas 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: compatible con insecticidas, fertilizantes, bioestimulantes que no tenga acción fungicida. Consulte la tabla de compatibilidades con fungicidas.

FITOTOXICIDAD: No es Fitotóxico en los cultivos a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



Dimensiones: 280 mm x 80 mm