

“LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Nombre comercial del producto: KATRINA® 700 WG

Nombre común: Fenhexamid + Cyprodinil

Nombre químico:

Fenhexamid: 2', 3' - dichloro-4' - hydroxy -1-, methyl cyclohexanecarboxanilide.

Cyprodinil: 4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine

Clase: FUNGICIDA AGRÍCOLA

Reg. PQUA N° 2075 - SENASA

Composición:

Fenhexamid 500 g/kg

Cyprodinil 200 g/kg

Aditivos c.s.p. 1kg

Fórmula empírica:


Fenhexamid: C₁₄H₁₇Cl₂NO₂ Cyprodinil: C₁₄H₁₅N₃

Peso molecular:


Fenhexamid: 302.20 g/mol Cyprodinil: 225.29 g/mol

Fórmula estructural:

Fenhexamid:



Cyprodinil:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

- Apariencia: Sólido
- Color: Marrón
- Olor: Inodoro
- Almacenamiento: **KATRINA® 700 WG** conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente, en su envase original y sellado.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

• **LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

• **“MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para conservar bebidas o alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Hydroxanilide + Aniinopyrimidine**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico, y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328-7700

ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para tal fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

KATRINA® 700 WG es un fungicida que combina la acción de dos ingredientes activos: Fenhexamid, inhibe el tubo germinativo impidiendo la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio ocasionado la muerte del patógeno; y Cyprodinil, interfiere con el ciclo biológico durante la penetración y crecimiento de micelio en la superficie foliar y al interior.

MÉTODO DE APLICACIÓN

KATRINA® 700 WG se emplea diluido en agua, se prepara una premezcla con la dosis recomendada, en un tercio del volumen a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua hasta lograr una mezcla homogénea.

EQUIPO DE APLICACIÓN

KATRINA® 700 WG puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARÁNDANO	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	14	(a) 15.0 (b) 3.0
PALTO	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	71	(a) 0.01 (b) 0.02

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
(a)Fenhexamid (b)Cyprodinil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la incidencia de la enfermedad y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación del producto. Se recomienda una aplicación de 2.0 kg/ha por campaña y una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo tratado 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

KATRINA® 700 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas o sustancias alcalinas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

KATRINA® 700 WG no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz, para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Katrina®
700 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO QUÍMICO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables (WG)



Titular del Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300

Formulado por:

NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.

8 South Liyuan Road, Jiangning District, Nanjing China

Importado, Envasado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO