



### ETIQUETA

KATRINA 700 WG - NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.

Revisión: 00  
Aprobado: JR  
Fecha: 07-11-17  
Página: 3 de 6

18,0 ± 0,3

# Katrina

700 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Gránulos dispersables - WG**

**Composición:**  
Fenhexamid : 500 g/kg  
Cyprodinil : 200 g/kg  
Aditivos : c.s.p.1kg

Registro PQUA N° 2075 - SENASA

**Titular de Registro:** **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Árica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.  
Telf.: (01) 617-3300

**Importado y Distribuido por:** **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **1 kg**

**Formulado por:**  
**NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.**  
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.  
Nanjing 211100 CHINA.

F. de Form.:  
N° Lote:  
F. de Venc.:

**NO INFLAMABLE**      **NO CORROSIVO**      **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

31,0 ± 0,3

1,7

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BIJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y lávese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para conservar bebidas y alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**  
**Grupo Químico: Hidroxiacetilida + Anilino pirimidine**

- En caso de intoxicación o ingestión, lave el paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluído bajo los párpados.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Sinticar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 328 7799  
ESSALUD: 411 8005 (línea 4)  
CISPROQUIM: 9900-98847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

**KATRINA® 700 WG** es un fungicida que combina la acción de dos ingredientes activos: Fenhexamid, inhibe el tubo germinativo impidiendo la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio ocasionado la muerte del patógeno; y Cyprodinil interfiere con el ciclo biológico durante la penetración y crecimiento de micelio en la superficie foliar y el interior.

**KATRINA® 700 WG** se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de uso. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a gasolina o motor, bocanetas, parasetas, etc.) que se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Se deberá evaluar la incidencia de la enfermedad y las condiciones climáticas de su desarrollo, para proceder a la aplicación de **KATRINA® 700 WG** se recomienda una aplicación máxima de 2.0 kg /ha por campaña y una campaña por año.

**PERIODO DE REINGRESO**  
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**  
**KATRINA® 700 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas o sustancias alcalinas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**  
**KATRINA® 700 WG** no es fitotóxico para los cultivos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PALTO	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	200	71	{a}0.01 {b}0.02

PC: Período de Carencia      {a} Fenhexamid      {b} Cyprodinil      LMR: Límite Máximo de Residuo