

14,8 ± 0,1

14,8 ± 0,1

19,9 ± 0,1

3,0

Katrina
700 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables - WG

Composición:
Fenhexamid : 500 g/kg
Cyprodinil : 200 g/kg
Aditivos : c.s.p.1kg

Registro PQUA N° 2075 - SENASA

Silvestre
Protección Vegetal

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 1 kg
(1 bolsa de 1 Kg)

Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA.

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para conservar bebidas y alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Hydroxanilide + Anilino pyrimidine

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

	ETIQUETA	Revisión: 00 Aprobado: JR Fecha: 07-11-17 Pagina: 6 de 6
	KATRINA 700 WG - NOVACROP PROTECTION	

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"					
CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L		
PALTO	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	200	71	(a) 0.01 (b) 0.02

PC: Período de Carenza (a) Fenexamid (b) Cyprodinil LMR: Límite Máximo de Residuos

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

FITOTOXICIDAD
KATRINA® 700 WG no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS"**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- **Novicio para el ganado.** Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- **Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.**
- **Peligroso para organismos acuáticos.**
- **No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.**
- **Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.**
- **Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.**
- **El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.**
- **No contaminar las fuentes de agua, con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.**
- **En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.**

ENVASE: Caja de cartón