

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es ligeramente peligroso. En su manejo se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para los plaguicidas:

- Leer detenidamente la etiqueta.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa
- No comer, fumar, ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto
- Terminada la aplicación lavarse y bañarse con abundante agua y jabón
- Manténgase el producto alejado del fuego
- No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicamentos de uso humano y animal
- Manipule los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Guardar en un lugar fresco y seco con bastante ventilación
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques, drenajes.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión haga lavado estomacal y siga con tratamiento sintomático:

DL₅₀ Oral Aguda (ratones) : > 5,000 mg/Kg
 DL₅₀ Dermal Aguda (ratones) : 1,000 mg/Kg

Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación :

CETOX: 0800 71911
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MAXI-GROW[®] EXCEL

**REGULADOR DE CRECIMIENTO
DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

SOLUCIÓN ACUOSA

Composición :

Combinación de extractos vegetales	114.20 g/L	Magnesio (Mg)	3.96 g/L
Auxinas	0.092 g/L	Fierro (Fe)	17.42 g/L
Giberelinas	0.106 g/L	Zinc (Zn)	26.92 g/L
Citoquininas	1.52 g/L	Manganeso (Mn)	13.46 g/L
Nitrógeno (N)	6.60 g/L	Cobre (Cu)	13.46 g/L
Fósforo (P ₂ O ₅)	13.46 g/L	Aditivos	csp 1 L
Potasio (K ₂ O)	13.46 g/L		
Calcio (Ca)	1.98 g/L		

PBUA N° 153 - SENASA

Titular del Registro **Serfi SA**

Formulado por:
COSMOCEL S.A.
 Via Matamoros No. 1501
 MEXICO

Importado y Distribuido por:



Av. República de Panamá 2577
 La Victoria, Lima-Perú
 Teléfono 710-4000

Lote No.:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Contenido Neto: 5 Litros

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAXI-GROW EXCEL es un regulador de crecimiento complejo de origen orgánico que contiene auxinas, giberelinas y citoquininas; además de nutrientes en forma quelatada. Todos estos componentes interactúan sobre los procesos metabólicos de las plantas, incrementando el rendimiento y la calidad de las cosechas.

MAXI-GROW EXCEL se usa en pulverización sobre el follaje. Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar un poco de agua en un envase, agregar la cantidad de producto que se va a usar y agitar, después se agrega el total de agua que se va a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

Cultivo	Dosis			PC (días)	LMR (ppm)
	L/cil 200L	L/ha	L/campaña		
Algodón	0,25	1,0	1,0	N.A.	N.A.
Arroz	1,0	1,0	1,0	N.A.	N.A.
Brócoli	0,25	0,5	1,0	N.A.	N.A.
Mandarina	0,25	1,0	1,0	N.A.	N.A.
Palto	0,25 – 0,30	1,0 – 1,5	1,0 – 1,5	N.A.	N.A.
Vid	0,25	2,0	2,0	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm) N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- En Algodón: se recomienda hacer 2 aplicaciones, la primera al inicio de la floración y la segunda: 2-3 semanas después.
- En Arroz: se recomienda hacer la aplicación 10 días antes del punto de algodón.
- En Brócoli: se recomienda hacer 2 aplicaciones, la primera 30 días después del transplante y la segunda: 15 días después.
- En Vid: se recomienda fraccionar la dosis en 3 aplicaciones, la primera: en pre-floración, la segunda: en cuajado y la tercera: en baya (10-12 mm).
- En mandarina y palto: se recomienda hacer 2 aplicaciones, la primera en el cuajado de frutos y la segunda en la fructificación.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresa al área tratada antes de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenidas en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN

