

ADAMA

Atranex
50 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Atrazine 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. N° 288-96-AG - SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Agan Ltd.
P.O. Box 262
Ashdod 771021, Israel.

Contenido neto: 4 Litros
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA NTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
 - No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
 - Utilizar ropa protectora, guantes botas y máscara durante el manipuleo y aplicación.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Triazinas
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.
 - Nota al médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX : 0800- 1-3040

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para animales domésticos.
 - Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Atranex 50 SC es un herbicida selectivo del grupo de las triazinas utilizado para el control de un amplio rango de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas en pre y post emergencia temprana. Agite el envase antes de abrir. Utilizar un volumen de agua de 200 - 400 litros por hectárea y boquillas de abanico plano. Para obtener una actividad herbicida completa y facilitar la absorción del producto es necesaria la presencia de humedad en el suelo, por lo que se debe aplicar durante la estación de lluvias o antes del riego .

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
CAÑA DE AZÚCAR	Yuva	Amaranthus spp.	1.5 - 2.5	N.A	0.20
	Hierba gallinaza	Chenopodium spp.			
	Amor seco	Bidens pilosa			
	Pata de gallina	Eleusine indica			
	Lechera	Euphorbia spp.			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Rabo de zorro	Setaria spp.			
	Chamico	Datura stramonium			
	Pichana	Sida acuta			
	Cerraja	Cenchrus aleraceus			
MAIZ	Capull cimarrón	Nicanora physalodes	1.5 - 2.5	60	0.20 (grano) 1.5 (forraje)
	Mata gusano	Flaveria bidentis			
	Yuva	Amaranthus spp.			
	Hierba gallinaza	Chenopodium spp.			
	Amor seco	Bidens pilosa			
	Pata de gallina	Eleusine indica			
	Lechera	Euphorbia spp.			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Rabo de zorro	Setaria spp.			
	Chamico	Datura stramonium			

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos N.A.: No Aplicable

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña. Aplicar a la pre-emergencia y/o post-emergencia temprana (2 - 4 hojas) de las malezas. No aplicar en el cultivo de caña de azúcar una vez que el campo haya cerrado.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
Ver la Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

cara

contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta necesita Hoja Informativa