

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Titular del Registro,
Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254, Of. N° 306,
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



ADAMA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manejo y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

- **Grupo químico:** Triazinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- **Nota al médico:** No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CICOTOX : 0800- 1-3040; ESSALUD en línea (01) 411-8000 opción 4; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.) (01)664-0000.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



- Peligroso para animales domésticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Atronex 50 SC es un herbicida selectivo del grupo de las triazinas utilizado para el control de un amplio rango de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas en pre y post emergencia temprana.

Agite el envase antes de usar. Utilizar un volumen de agua de 200 - 400 litros por hectárea y boquillas de abanico plano.

Para obtener una actividad herbicida completa y facilitar la absorción del producto es necesaria la presencia de humedad en el suelo, por lo que se debe aplicar durante la estación de lluvias o antes del riego.

CULTIVO		MALEZAS		DOSIS (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
CAÑA DE AZÚCAR	Nombre común	Nombre científico				
	Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>				
	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium spp.</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Lechera	<i>Euphorbia spp.</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1.5 - 2.5	N.A	0.20	
	Rabo de zorro	<i>Setaria spp.</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Pichana	<i>Sida acuta</i>				
Cerraja	<i>Cenchrus oleraceus</i>					
Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>					
Mata gusano	<i>Flaveria bidentis</i>					
MAIZ	Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>				
	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium spp.</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				0.20
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			(grano)	
	Lechera	<i>Euphorbia spp.</i>	1.5 - 2.5	60		
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Rabo de zorro	<i>Setaria spp.</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			1.5	
	Pichana	<i>Sida acuta</i>			(forraje)	
	Cerraja	<i>Cenchrus oleraceus</i>				
Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>					
	<i>Flaveria bidentis</i>					

P.C.: Periodo de Carenia LMR : Limite Máximo de Residuos N.A.: No Aplicable

Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña.
Aplicar a la pre-emergencia y/o post-emergencia temprana (2 - 4
hojas) de las malezas.
No aplicar en el cultivo de caña de azúcar una vez que el campo haya
cerrado.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
Ver la Hoja Informativa adjunta.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta necesita Hoja Informativa