

0.5 cm

0.5 cm

18.0 cm

línea
de semicorte
(troquel)

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Roxicop®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Copper Oxychloride 800 g/kg
Aditivos csp..... 1kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico:** compuesto inorgánico.
- En caso de intoxicación, llámé al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: Enjuagar la piel con agua, Lavar la ropa antes de usarla.
- En caso de inhalación: Retirar al paciente al aire fresco. Si no está respirando, darle respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno. Llamar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con agua fresca por lo menos durante 15 minutos. Llamar al médico.
- En caso de ingestión: No inducir a vomito a menos que sea supervisado por personal médico. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Si la persona afectada está consciente y alerta, administrar carbón activado y gran cantidad de agua.
- Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia:** CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Toxico para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ROXICOP® es un fungicida cúprico finamente micronizado y de baja toxicidad para mamíferos. Actúa por contacto e inhalación de vapores evitando la germinación de las esporas de los hongos. Controla además algas, musgos y líquenes que se acumulan en el follaje, ramas y tallo de árboles frutales. Para preparar la solución, diluir el fungicida a las dosis recomendadas en un poco de agua (4 a 8 litros). Luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen necesario. Es indispensable agitar la solución constantemente. Puede aplicarse con bombas de mochila, tractor, recomendándose usar adherentes.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/cil	kg/ha		
CAFETO	Roya amarilla	<i>Hemileia vastatrix</i>	1	4 - 5	15	50
ESPÁRRAGO	Mancha foliar	<i>Cercospora asparagi</i>	-	2	3	5
NARANJO	Gomosis del cuello	<i>Phytophthora parasitica</i>	1	4 - 6	15	20
		<i>Cephaeleuros virescens</i>	0.75	-	5	20
PALTO	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.40	-	-	-
		<i>Phytophthora infestans</i>	-	2	15	5

P.C.: Período de Carencia en días. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar hasta un máximo de dos aplicaciones por campaña en un intervalo mínimo de 14 días y cuando se observe los primeros síntomas de la plaga en el cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: ROXICOP® es compatible con la mayoría de plaguicidas e incompatible con compuestos a base de azufre.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Reg. PQUA N°2111 – SENASA

CONTENIDO NETO: 1 kg

Formulado por:
Sales y Derivados de Cobre S.A.

Calle 4, Mza. B1, Lote 18, Urb. Industrial Las Vegas
Puente Piedra, Lima 22. Perú.

Lote N°:

F. Form.:

F. Venc.:

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



0.5 cm

22.0 cm

3.3 cm

0.5 cm