

Tamaño final: 29.2 x 15.3 cm

25.10.2021

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO"**

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Manténgase alejado del fuego.
- No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico:** Piretroide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de ingestión accidental, provoque vómitos hasta que arroje la mayor cantidad del veneno que tiene en el estómago.
- **Nota al Médico:** No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.
- En caso de **EMERGENCIAS** llame a los siguientes teléfonos:

SAMU: 106
SERFI: 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el envase, lavándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase usado a centro de acopio autorizado.
 - Prohíbese el riado, el uso, el almacenamiento, el transporte, el lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

Composición:
Cypermethrin..... 250 g/L
Aditivos..... csp 1 L

PLU N° 2058-SENASA

Titular del Registro: **SERFI S.A.**

Formulado por:

Serfi
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 51 (1) 710-4068

Distribuido por:

h
herrera &
mendoza s.a.
El Palmar 153 - Lima 12
Teléfono: 51 (1) 479-0286
Fax: 51 (1) 479-0418

N° de Lote :
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Contenido Neto: 20 Litros



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **MACHAZO** es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión.
 - **MACHAZO** es de amplio espectro y actúa sobre un gran número de insectos.
 - **MACHAZO** tiene buena actividad residual, lo que permite que su efecto se prolongue en las plantas tratadas. También posee actividad repelente.
 - **MACHAZO** se usa en pulverización sobre el follaje.
- Preparación: Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar un poco de agua en un envase, agregar la cantidad de producto que se va a usar y agitar; después se agrega el total de agua que se va a aplicar; es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		Dosis (g/200 L de agua)	L/h	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO				
Ajo	Araña roja	Dysdercus	200-300	0,3-0,5	20	0,05
	Gusano rosado	Pectinophora gossypiella	200-300	0,3-0,5	20	0,05
Tomate	Polilla	Tuta absoluta	200-300	0,2-0,4	7	0,05
Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	200-300	0,3-0,5	21	0,05

P.C.: Periodo de Carenia **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- **MACHAZO** debe aplicarse cuando se observe las primeras infestaciones y en los primeros estadios de desarrollo de la plaga. Realizar máximo una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas.

COMPATIBILIDAD

- **MACHAZO** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

- No se han observado síntomas de fitotoxicidad

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MV PRODUCCIONES GRAFICAS



H&M



C100 M0 Y0 K0 C78 M2 Y98 K9
CO M30 Y95 K0 K100

Pega