"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR **EL PRODUCTO"**

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES YADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Manténgase alejado del fuego.
- No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Piretroide.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la

- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos 15 minutos, cuidand que los párpados estén levantados. En caso de ingestión accidental, provoque vómitos
- Nota al Médico: No tiene antídoto espe En caso de **EMERGENCIAS** llame a los siguientes

TO DESECTION Y ENVASES VACIOS

ebe reutilizarse. tres veces este envase y vierta la solución y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue

en la ezcla de apl o dep envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente. para su gestión.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE VISI AGRÍCO. INSECTICIDA ACINÍCOLA

...csp 1 L

PQUA N° 2058-SENASA

Titular del Registro: SERFI S.A.

Formulado por:



La Victoria, Lima-Perú Teléfono 51 (1) 710-4068

 N° de Lote : Fecha de Form.: Fecha de Venc. :

Contenido Neto: 200 L



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Distribuido por:

El Palmar 153 - Lima 12

Teléfono: 51 (1) 479-0286 Fax:51 (1) 479-0418

INSTRUCCIONES DE USOY MANEJO

- MACHAZO es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión
- MACHAZO es de amplio espectro y actúa sobre un gran número de insectos.
- MACHAZO tiene buena actividad residual, lo que permite que su efecto se prolongue plantas tratadas. También posee actividad repelente.
- MACHAZO se usa en pulverización sobre el follaje.
- Preparación: Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar un envase, agregar la cantidad de producto que se va a usar y agitar agua que se va a aplicar; es necesario calibrar el equip agua.

"CONSULTE CONTUNINGENIERO

	CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			
		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL / 200 L	L / ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Algodón	Arrebiatado	Dysdercus peruvianus	200-300	0,3-0,5	20	0.2
		Gusano rosado	Pectinophora gossypiella	200-300	0,3-0,5	20	0.2
	Tomate	Polilla	Tuta absoluta	200-300	0,2-0,4	7	0.2
	Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	200-300	0,3-0,5	21	0.05

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIAY ÉPOCA DEAPLICACIÓN

- MACHAZO debe aplicarse cuando se observe las primeras infestaciones y en los primeros estadios de desarrollo de la plaga. Realizar máximo una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas.

COMPATIBILIDAD

- MACHAZO es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla

FITOTOXICIDAD

- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasional fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular de registro o con el distribuidor de producto.















MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO




















MV PRODUCCIONES GRAFICAS



Pantone 355 C

Pantone 293 C

Pantone 378C H&M

