

Argos® 60 wp

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Metsulfuron methyl..... 600 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 455 - SENASA



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304 Urbanización Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: 3481018 - 3499609

Formulado por:
POINT INTERNATIONAL LTD.
42 St Margarets Grove Twickenham
TW 1 1JG United Kingdom
Teléfono: (44-20) 88923862(86-510)8785 1001

Contenido neto: **50 g**
Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No utilice este envase para conservar alimentos o agua.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sulfonilureas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- Contacto ocular: lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia o solución salina en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
- Contacto dermal: quitar la ropa y lavar la piel, los cabellos con agua y jabón sin frotar.
- Inhalación: retirar a la persona de la zona contaminada y trasladarla a un lugar bien ventilado.
- Ingestión: No administrar nada por vía oral; en caso de ingestión si la persona esta consciente provocar el vómito.

Nota al médico: tratamiento sintomático.
Antídoto: no tiene.

Teléfonos de emergencia:
CICOTOX: 0800-1-3040.
ESSALUD: 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARGOS 60 WP es un herbicida sistémico, perteneciente al grupo de las Sulfonilureas, de absorción foliar y radicular.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar el tanque con agua hasta la mitad, luego diluya la dosis indicada y complete con agua hasta alcanzar el volumen total, agite y proceda a aplicar. La aplicación se puede hacer con cualquier equipo de aspersión, manual o mecánico y con boquilla para herbicidas de buena cobertura, tratando de hacer una aplicación uniforme. Hacer las aplicaciones por las mañanas (poco viento) para evitar la contaminación de cultivos vecinos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Arroz	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	4 - 8	N.A.	0.01
	"Hierba del gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>	4 - 8		
	"Lechera"	<i>Euphorbia hirta</i>	4 - 8		
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	4 - 8		
	"Cerraja"	<i>Sonchus oleraceus</i>	4 - 8		
Caña de azúcar	"Capulí"	<i>Nicandra physaloides</i>	8	30	0.05
	"Yuyo"	<i>Amaranthus hybridus</i>	8		
	"Quinoa silvestre"	<i>Chenopodium album</i>	8		
	"Hierba del gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>	8		
	"Lechera"	<i>Euphorbia hirta</i>	8		
	"Lengua de vaca"	<i>Rumex crispus</i>	8		
	"Nabo silvestre"	<i>Brassica campestris</i>	8		
	"Hierba mora"	<i>Solanum nigrum</i>	8		
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	8		

P.C.: Período de carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).
N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El producto debe ser aplicado en post-emergencia temprana al cultivo (desde que presenta de 4 a 5 hojas hasta antes de la etapa de embuche) y a la maleza (no debe de sobrepasarse los 10 cm de altura). Se recomienda una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda aplicar ARGOS 60 WP solo. Es decir no realizar mezcla con otros plaguicidas. No compatible con fertilizantes.

FITOTOXICIDAD:

ARGOS 60 WP no es fitotóxico a los cultivos indicados en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

