

Herbit

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Bensulfuron methyl 600 g/kg

Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO S.A. 

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

FORMULADOR:

FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.

29F, Soho Mansion, No.8 South Zhongshan Road, Nanjing. China.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 100g

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un ambiente fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Sulfonilurea
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0 800 13040 // FARMAGRO S.A.: 6141500
ESSALUD: 0 801 10200 // CIPROSQUIM: 0 801 050847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido del envase inutilícelo perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
HERBIT es un herbicida sistémico selectivo al arroz y que se emplea en post emergencia del cultivo y las malezas. Actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos, detiene la división celular y el crecimiento.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
Llene el tanque con agua hasta un tercio a utilizar, añada la dosis recomendada de **HERBIT**, agite hasta lograr una mezcla homogénea y finalmente complete con la cantidad de agua necesaria. Continúe agitando hasta antes de iniciar la aplicación.
Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda una aplicación por campaña al año, después del transplante (15 a 20 días) cuando el cultivo está en inicio de macollamiento.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingrese a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
HERBIT es compatible con plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD:
HERBIT no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Coquito	<i>Cyperus difformis</i>	0.20	80	0.01
	Hierba de golondrina	<i>Cyperus esculentus</i>			

*PC: Periodo de carencia *L.M.R.: Límite máximo de residuos

