

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Evite almacenar por encima de los 35°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

#### PRIMEROS AUXILIOS

##### Grupo Químico: Astrobilurinas+Triazoles

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**Teléfonos de emergencia:**  
**ESSALUD:** 4118000 Anexo 4  
**Infosalud:** 0800-10-828  
**CICOTOX:** 0800-1-3040, 3287700

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

# EVITO® T

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición:

Fluoxastrobin.....125 g/l  
Tebuconazole.....325 g/l  
Aditivos .....c.s.p. 1.00 L

PQUA N° 1864 - SENASA

#### Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.  
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague  
Jesús María - Lima - Perú



#### Formulado por:

Arysta LifeScience Colombia S.A.S.  
Carrera 2 Este # 15-82  
Madrid, Cundinamarca, Colombia

#### Importado y Distribuido por:

SERFI S.A.  
Av. República de Panamá 2577  
La Victoria - Lima - Perú  
Telf. 710-4000



N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:  
Contenido neto: 1 L

©EVITO es Marca Registrada de Arysta LifeScience

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Es un fungicida sistémico de amplio espectro de acción preventiva y curativa.

El producto **EVITO® T** es una mezcla de dos fungicidas: Fluoxastrobin y Tebuconazole. Fluoxastrobin y Tebuconazole se complementan eficientemente en el control de hongos fitopatógenos. El Fluoxastrobin actúa sobre la germinación de la espóra y el crecimiento del micelio de los hongos, inhibiendo la respiración mitocondrial. El Tebuconazole inhibe la biosíntesis del ergosterol, impidiendo así la multiplicación del hongo.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO  | Enfermedad            |                                  | Dosis   |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)                        |
|----------|-----------------------|----------------------------------|---------|-----------|----------------|----------------------------------------|
|          | Nombre común          | Nombre científico                | (L/ha)  | (L/200L)  |                |                                        |
| Maíz     | Mancha negra del maíz | <i>Phyllachora maydis</i>        | 0.4-0.6 | -         | 36             | 0.05 <sup>A</sup><br>0.02 <sup>B</sup> |
|          | Mancha de la hoja     | <i>Helminthosporium turcicum</i> |         |           |                |                                        |
| Arroz    | Pyricularia           | <i>Pyricularia oryzae</i>        | 0.3-0.5 | -         | 35             | 1.5 <sup>A</sup><br>0.05 <sup>B</sup>  |
| Papa     | Hielo (Rancha)        | <i>Phytophthora infestans</i>    | -       | 0.3       | 35             | 0.02 <sup>A</sup><br>0.1 <sup>B</sup>  |
| Arándano | Cabeza de clavo       | <i>Alternaria tenuissima</i>     | -       | 0.20-0.25 | 24             | 1.5 <sup>A</sup><br>1.9 <sup>B</sup>   |

A: Tebuconazole B: Fluoxastrobin

L.M.R.: Límite máximo de residuos

P.C. Periodo de carencia

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. El momento oportuno de su aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la enfermedad en las plantas del campo. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña en maíz y arroz. Usar la dosis mayor cuando la presión de la enfermedad es alta, con intervalo mínimo de frecuencia de 7-12 días entre aplicaciones. El mojamiento recomendado en el cultivo de arroz es de 200 litros de agua por hectárea. En los cultivos de papa y arándano, realizar como máximo 1 aplicación por campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente, excepto con aquellos de reacción altamente alcalina.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

