

ADAMA

Masada®
48 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Metribuzin480 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 810-SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia.

Contenido neto: 4 Litros
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
 - Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
 - Después de usar el producto bñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Triazinone
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto por lo menos durante 15 minutos. Acuda a un médico.
 - En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y enjuagar con agua tibia. Llame a un médico.
 - Nota al médico: Se desconoce el antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX : 0800- 13040

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopia autorizado.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Masada 48 SC es un herbicida selectivo que se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas. Para activar el efecto pre-emergente del herbicida se requiere la presencia de humedad en el suelo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
ESPÁRRAGO	Capulí cimarrón (Nicandra physalodes), Verdolaga (Portulaca oleracea), Pata de gallina (Eleusine indica), Lechera (Euphorbia heterophylla), Yuyo (Amaranthus viridis), Amor seco (Bidens pilosa)	0.15 - 0.20	60	0.1
PAPA	Chamico (Datura stramonium), Lechera (Euphorbia hirta), Lengua de vaca (Rumex crispus), Trebol (Trifolium pratense), Yuyo (Amaranthus hybridus)	0.30 - 0.40	60	0.6
TOMATE	Capulí cimarrón (Nicandra physalodes), Verdolaga (Portulaca oleracea), Hierba gallinaza (Chenopodium murale), Cola de Alacrán (Heliotropium curassavicum), Pata de gallina (Eleusine indica), Rabo de zorro (Setaria verticillata)	0.20 - 0.30	60	0.1

P.C.: Período de Carenia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Número máximo de aplicaciones por campaña-año: Dos (02) en espárrago y tomate; una (01) en papa.
Intervalo mínimo entre aplicaciones: Espárrago : 20 días , Tomate : 14 días
Momento de aplicación:
Ver Hoja Informativa adjunta.

PERIODO DE REINGRESO
Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
No tiene incompatibilidad conocida.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



cara

contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm por cara
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa