

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Reg. PQUA N° 810-SENASA

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia.

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto por lo menos durante 15 minutos. Acuda a un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y enjuagar con agua tibia. Llame a un médico.
- Nota al médico: Se desconoce el antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX : 0800- 13040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Masada 48 SC es un herbicida selectivo que se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas. Para activar el efecto pre-emergente del herbicida se requiere la presencia de humedad en el suelo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS		PC (días)	LMI (ppm)
		(L/200 L)	(L/ha)		
ESPÁRRAGO	Capulí cimarrón (<i>Nicandra physalodes</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Pata de gallina (<i>Equisetum indicum</i>) Lechera (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Yuyo (<i>Amaranthus</i>) <i>viridis</i> , Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>)	0.08-0.20	0.15-0.20	14	0.1
PAPA	Chamico (<i>Datura stramonium</i>) Lechera (<i>Euphorbia hirta</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Trebol (<i>Trifolium pratense</i>) Yuyo (<i>Amaranthus hybridus</i>)	-	0.30-0.40	60	0.1
TOMATE	Capulí cimarrón (<i>Nicandra physalodes</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Hierba gallina (<i>Heliotropium curassavicum</i>) Cola de ábaco (<i>Heliotropium curassavicum</i>) Pata de gallina (<i>Equisetum indicum</i>) Rabo de zorro (<i>Sentella verticillata</i>)	-	0.20-0.30	60	0.1

P.C.: Periodo de Carenia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña-año: Dos (02) en espárrago y tomate; una (01) en papa.
Intervalo mínimo entre aplicaciones: Espárrago : 20 días , Tomate : 14 días

Momento de aplicación:
Ver Hoja Informativa adjunta.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver hoja informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



cara

contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm por cara
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa