

# Masada<sup>®</sup>

## 48 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**  
 SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:  
 Metribuzin ..... 480 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 810-SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
 Av. El Derby N° 254 Of 503.  
 Santiago de Surco. Lima - Perú.  
 Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia**  
 Calle 1 C N° 7-53 Int Zona Franca  
 Barranquilla, Colombia.

Contenido neto: **4 Litros**  
 Lote No.  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO



ADAMA

### LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto bñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazinone
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto por lo menos durante 15 minutos. Acuda a un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y enjuagar con agua tibia. Llame a un médico.
- Nota al médico: Se desconoce el antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)  
 CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX: 0800-13040

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopia autorizado.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Masada 48 SC es un herbicida selectivo que se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas. Para activar el efecto pre-emergente del herbicida se requiere la presencia de humedad en el suelo.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO   | MALEZAS   | DOSIS     |           | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |   | (L/200 L) | (L/ha)    |           |           |
| ESPÁRRAGO | Capullí cimarrón (Nicandra physalodes)<br>Verdolaga (Portulaca oleracea)<br>Pata de gallina (Eleusine indica)<br>Lechera (Euphorbia heterophylla)<br>Yuyo (Amaranthus viridis), Amar seco (Bidens pilosa)                                     | 0.08-0.20 | 0.15-0.20 | 14        | 0.1       |
| PAPA      | Chamico (Datura stramonium),<br>Lechero (Euphorbia hirta)<br>Lengua de vaca (Rumex crispus)<br>Trebol (Trifolium pratense)<br>Yuyo (Amaranthus hybridus)  | -         | 0.30-0.40 | 60        | 0.6       |
| TOMATE    | Capullí cimarrón (Nicandra physalodes)<br>Verdolaga (Portulaca oleracea)<br>Hierba gallinazo (Chenopodium murale)<br>Cola de Alacrán (Heliotropium curassavicum)<br>Pata de gallina (Eleusine indica)<br>Rabo de zorro (Setaria verticillata) | -         | 0.20-0.30 | 60        | 0.1       |

P.C.: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña-año: Dos (02) en espárrago y tomate; una (01) en papa.  
 Intervalo mínimo entre aplicaciones: Espárrago : 20 días, Tomate : 14 días

Momento de aplicación:  
 Ver Hoja Informativa adjunta.

#### PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver hoja informativa adjunta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



cara

contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm por cara  
 Esta etiqueta requiere Hoja Informativa