

ADAMA

Masada®
48 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SC)

COMPOSICIÓN:
Metribuzin 480 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 810-SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Interior
Zona Franca Barranquilla, Colombia.

CONTENIDO NETO: 20 LITROS
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



CARA

Dimensiones: 184 mm x 190 mm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - No aspirar las gotitas de aspersión durante la aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
 - Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manejo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
 - Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
 - No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Triazinone
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir el vómito. Lávese la boca con abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no hay respiración, realizar respiración artificial. Acuda a un médico.
 - En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y abrigado.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto por lo menos durante 15 minutos. Acuda a un médico.
 - En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y enjuagar con agua tibia. Llame a un médico.
 - Nota al médico: Se desconoce el antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800- 1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - No utilizar este envase para conservar alimentos o agua potable.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Masada 48 SC es un herbicida selectivo que se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas. Para activar el efecto pre-emergente del herbicida se requiere la presencia de humedad en el suelo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
ESPÁRRAGO	Capulí cimarrón (Nicandra physalodes), Verdolaga (Portulaca oleracea), Pata de gallina (Eleusine indica), Lechera (Euphorbia heterophylla), Yuyo (Amaranthus viridis), Amor seco (Bidens pilosa)	0.15 - 0.20	60	0.1
PAPA	Chamico (Datura stramonium), Lechera (Euphorbia hirta), Lengua de vaca (Rumex crispus), Trebol (Trifolium pratense), Yuyo (Amaranthus hybridus)	0.30 - 0.40	60	0.6
TOMATE	Capulí cimarrón (Nicandra physalodes), Verdolaga (Portulaca oleracea), Hierba gallinazo (Chenopodium murale), Cola de Alacrán (Heliotropium curassavicum), Pata de gallina (Eleusine indica), Rabo de zorro (Setaria verticillata)	0.20 - 0.30	60	0.1

P.C.: Período de Carenacia LMR : Límite Máximo de Residuos


FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Número máximo de aplicaciones por campaña-año: Dos (02) en espárrago y tomate; una (01) en papa.
Intervalo mínimo entre aplicaciones: Espárrago : 20 días, Tomate : 14 días
Momento de aplicación:
Realizar la aplicación en pre o post-emergencia temprana cuando las malezas tengan entre 2.5 a 5 cm de altura y no más de 4 a 5 hojas verdaderas.
Papa.- después del primer riego.
Espárrago.- luego de la cosecha, durante el desarrollo vegetativo del cultivo.
Tomate (de transplante).- realizar la primera aplicación cuando las plantas estén bien enraizadas (no menos de 20 días después del transplante).
Tomate (de siembra directa).- 1era. aplicación- inmediatamente después de la siembra. 2da aplicación- en plántulas con al menos 4 -6 hojas verdaderas.

PERIODO DE REINGRESO
Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
No tiene incompatibilidad conocida.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CONTRACARA