

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No aspirar las gotitas de aspersión durante la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazinone
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no hay respiración, realizar respiración artificial. Acuda a un médico.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y abrigado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto por lo menos durante 15 minutos. Acuda a un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y enjuagar con agua tibia.
- **Nota al médico:** Se desconoce el antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- **Teléfonos de Emergencia:**
SAMU:106; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000.

Formulado por:
ADAMA Andina B.V.
Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Int
Zona Franca Barranquilla,
Colombia.

CONTENIDO NETO: **200 Litros**
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Masada[®] 48 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Metribuzin 480 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 810-SENASA



ADAMA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Masada 48 SC es un herbicida selectivo que se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas. Para activar el efecto pre-emergente del herbicida se requiere la presencia de humedad en el suelo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(L/200L)	(L/ha)		
Espárrago	Amor seco Capulí cimarrón Pata de gallina Verdolaga Yuyo	Bidens pilosa Nicandra physalodes Eleusine indica Portulaca oleracea Amaranthus viridis	0.3 - 0.4	-	12	0.1
Papa	Chamico Lechera Lengua de vaca Trebol Yuyo	Datura stramonium Euphorbia hirta Rumex crispus Trifolium pratense Amaranthus hybridus	-	0.30 - 0.40	60	0.6
Tomate	Capulí cimarrón Verdolaga Hierba gallinazo Cola de Alacrán Pata de gallina Rabo de zorro	Nicandra physalodes Portulaca oleracea Chenopodium murale Heliotropium curassavicum Eleusine indica Setaria verticillata	-	0.20 - 0.30	60	0.1

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Espárrago.- realizar una (1) aplicación por campaña, considerando dos campañas al año. **Tomate.-** realizar dos (2) aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicación de 14 días. **Papa.-** Realizar una (1) aplicación por campaña, considerando una campaña al año.

Momento de aplicación:

Realizar la aplicación en pre o post-emergencia temprana cuando las malezas tengan entre 2.5 a 5 cm de altura y no más de 4 a 5 hojas verdaderas.
Espárrago.- desde la etapa de brotamiento hasta antes de la cosecha.
Papa.- después del primer riego.
Tomate (de transplante).- realizar la primera aplicación cuando las plantas estén bien enraizadas (no menos de 20 días después del transplante).
Tomate (de siembra directa).- 1era. aplicación- inmediatamente después de la siembra. 2da aplicación- en plántulas con al menos 4 -6 hojas verdaderas.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

No tiene incompatibilidad conocida.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Dimensiones: 330 mm x 200 mm