

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa leve irritación en los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Oxadiazolone + Chloroacetalinide
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No dar de beber nada al paciente si está inconsciente.
- No existe Antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 08001-3040 (gratuito) / 328 – 7398
Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 0800-10-828
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al Centro de Acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

MEGAKILLER

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Oxadiazon.....185 g/L
Butachlor.....325 g/L
Aditivoscsp.1L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU S.A.C
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

Importado por:
SHARDA PERU S.A.C
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

Formulado por:
SHARDA CROPCHEM LTD.
Domnic Holm, 29th Road,
Bandra (w), Mumbai 400050, India

Contenido Neto: 20 L

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MEGAKILLER es un herbicida pre emergente para el control de malezas gramíneas, hoja ancha y ciperáceas.

MEGAKILLER está formado por ingredientes activos; Oxadiazón que actúa como inhibidor de la acetil coenzima A carboxilasa (ACCCase) y Butachlor que actúa como inhibidor del crecimiento al afectar el metabolismo de lípidos.

Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregar la cantidad correspondiente de **MEGAKILLER** revolviendo constantemente. Finalmente complete hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz	Coquito Moco de pavo Plumilla Rabo de zorro Verdolaga Yuyo Gramma mazorquilla Pata de gallina	<i>Cyperus difformis</i> <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Leptochloa crusgalli</i> <i>Setaria spp.</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus sp.</i> <i>Ischaemum rugosum</i> <i>Eleusine indica</i>	3	N.A.	0.05 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC = periodo de carencia(días)

N.A.: No aplica

(1) Oxadiazon

(2) Butachlor

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **MEGAKILLER** (i.a. Oxadiazon + Butachlor) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

Aplicar **MEGAKILLER** en pre emergencia del cultivo y de las malezas.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Antes de realizar mezclas con **MEGAKILLER** debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar (miscibilidad y fitocompatibilidad) en pequeña escala.

FITOTOXICIDAD:

MEGAKILLER no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

