

28.5 CM

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, lávese, cambíese, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Strobilurin - Triazol
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico, muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA:**

**SAMU:106**  
**CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C.: 044-407781**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

# EMPERADOR

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Azoxystrobin.....250 g/L  
 Difenconazole.....250 g/L  
 Aditivos.....c.s.p 1L

**REG. PQUA N°2139 - SENASA**

Titular del Registro:  
**CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC**  
 Calle B. N° 141-Int. 202.  
 Pro 9no sector, San Martín de Porres  
 Teléfono: 044 407781

Importado y distribuido por:



**CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC**  
 RUC: 20492612767  
 www.cgreenvalley.com

Formulado por:

**NANJING RHONQUIM CO. LTD.**  
 No.26 Majia street,  
 Nanjing 210009 China  
 Teléfono: +86 25 52621629  
 Fax: +86 25 83303203

**Contenido Neto: 1 L**

Lote N°:  
 Fecha de Form.:  
 Fecha de Venc.:

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

EMPERADOR es un fungicida sistémico y de contacto, actúa afectando el metabolismo energético e inhibiendo la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo, lo que conlleva finalmente a la muerte del hongo.

EMPERADOR se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
UVA	"Oldiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	14	2' 3"

**L.M.R. = Límite máximo de residuos**

**PC = periodo de carencia**

**1 Azoxystrobin  
2 Difenconazol**

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo. Cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 1 campaña al año. De ser necesario una segunda aplicación, realizarla con un intervalo de 14 a 20 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 h después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante ese período.

**COMPATIBILIDAD**

EMPERADOR es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

EMPERADOR no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

14.5 CM



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

