

28.5 CM

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, lávese, cambíese, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Strobilurin - Triazole
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico, muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:
SAMU:106

CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C.: 044-407781

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



EMPERADOR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin.....250 g/L
 Difenconazole.....250 g/L
 Aditivos.....c.s.p 1L

REG. PQUA N°2139 - SENASA

Titular del Registro:
CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC
 Calle B. N° 141, Int. 202,
 Pro 9no sector, San Martín de Porres
 Teléfono: 044 407781

Importado y distribuido por:

Green Valley
 Contigo en tu campo
CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC
 RUC: 20492612767
 www.cgreenvalley.com

Formulado por:
NANJING RHONQUIM CO. LTD.
 No.26 Majia street,
 Nanjing 210009 China
 Teléfono: +86 25 52621629
 Fax: +86 25 83303203

Contenido Neto: 200 L

Lote N°:
 Fecha de Form.:
 Fecha de Venc.:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EMPERADOR es un fungicida sistémico y de contacto, actúa afectando el metabolismo energético e inhibiendo la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo, lo que conlleva finalmente a la muerte del hongo.

EMPERADOR se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGÁ		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
UVA	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	14	2' 3'

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC = periodo de carencia

**1 Azoxystrobin
2 Difenconazol**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo. Cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 1 campaña al año. De ser necesario una segunda aplicación, realizarla con un intervalo de 14 a 20 días.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 h después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante ese periodo.

COMPATIBILIDAD

EMPERADOR es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

EMPERADOR no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

15 CM



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

