



ETIQUETA

BRENOM 200 SC - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED (1 L)

Revisión:
Aprobado: CD
Fecha: 04-02-2020
Página: 4 de 6

28.3 ± 0.3 cm

0.8 ± 0.2

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
'MANTIENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS'

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evitar el contacto con la piel, la ropa o el equipo.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo llave, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Evitar el contacto con alimentos, animales domésticos, aves, peces, abejas, mariposas, etc.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua.
- No ingerir alimentos que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Bridged Diphenyl
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y envíele la etiqueta.
- No ingerir el producto, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeciendo convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén lavados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y cámbiese contaminada. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y tráaslala a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Advertido: Este producto no debe ser ingerido. El tratamiento es sintomático.

CICTODX, 0900-53040
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 411-8000 (opción 4) NEOAGRUM S.A.C.: 617-3300

NEOAGRUM S.A.C.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 0900-53040

- Manejo y disposición de desechos y envases vacíos:
- Después de usar el producto, asegure los botes con sus tapas y cierre los envases y la solución en la mezcla de aplicación y luego infiltre el residuo en un lugar autorizado o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades.
- No lavar ni limpiar el equipo ni el envase.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Prohibido para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir ornatos en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para ello.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BRENOM® 200 SC es un acaricida que tiene acción por contacto e ingestión. Es altamente selectivo. Actúa como inhibidor del complejo II en la cadena de transporte de electrones mitocondriales causando la pérdida de la coordinación motriz (parálisis y muerte). Tiene efecto sobre todos los estadios del ciclo. Por su modo de acción puede ser usado en cualquier momento del ciclo de vida de los ácaros.

BRENOM® 200 SC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego se aplica al cultivo. El producto debe ser aplicado en la mañana o en la tarde, evitando el viento y la deriva a cultivos vecinos. Aplicar temprano en la mañana, para evitar el viento y la deriva a cultivos vecinos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Table with columns: CULTIVO, PLAGA, Dosis, L.M.R. (límites máximos de residuos). Rows include Fresa, Mandarina, Pálido, and Vid.

P.C.: Fecundación de crías. L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Dosis máxima aprobada es de un 1.0 L/ha al año. Se recomienda aplicar BRENOM® 200 SC al observar los primeros indicios de la plaga, realizando una buena cobertura sobre el follaje. Para el cultivo de maní y Vid, realizar máximo 01 aplicación por campaña, considerando una campaña por año.

PERIODO DE RENGRESO:

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

BRENOM® 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

BRENOM® 200 SC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

15.0 ± 0.3 cm

2.3 cm

Color and text legend: ENVASE: PEAD, LOGO NEOAGRUM, LOGO PRODUCTO, TEXTO, B.TOXICOLOGICA, PANT: 343, PANT: 377, PANT: 1375, NEGRO, NEGRO, PANT: 293 C

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del GRUPO SILVESTRE