

ETIQUETA

Revisión: Aprobado: CD
Fecha: 04-02-2020
Página: 5 de 6

BRENOM 200 SC - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED

VALIDO PARA: 4L., 200L



48.0 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.3

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Evitar el contacto con la piel, la ropa, los ojos, las mucosas y el agua.
- No almacenar el producto en recipientes que hayan sido utilizados para otros fines.
- Usar ropa protectora durante el transporte y aplicación: botas, guantes, mascarilla, etc.
- Después de usar el producto cúbrase, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMERA AUXILIO:

- En caso de inhalación, sacar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua y beber abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lavar la ropa y el cuerpo contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contaminación de la piel, retirar la ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contaminación de la ropa, lavar la ropa con abundante agua y jabón.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, arroyos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrecitos del producto.
- No utilizar el producto en áreas cercanas a ríos, lagos, lagunas, etc.
- Prohibido para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

CONTACTO: TEL: 01-226-6647
ESALUD: 01-8000 (línea 9)
NEOGRUM S.A.C. 01-7330

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Deshacer el envase según lo indicado en el centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el registro de este proceso.

Brenom[®] 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Cyflumetofen 200 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. POUA N° 2143 - SEMASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOGRUM S.A.C.



PJ. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Caimarquilla
 Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 01-7330

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
 29 Xiaohang Road, Nanjing
 Jiangsu Province, CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Contenido neto:

N° de Lote:
 F. de Form.:
 F. de Venc.:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
 BRENOM[®] 200 SC es un acaricida que tiene acción por contacto e ingestión. Es altamente selectivo. Actúa como inhibidor del complejo II en la cadena de transporte de electrones mitocondrial causado la pérdida de la coordinación motriz (parálisis y muerte). Tiene efecto sobre todos los estadios del ácaro. Por su modo de acción puede ser usado en tratamientos de rociación con otros acaricidas usados para los cultivos.
 BRENOM[®] 200 SC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego verter la solución en el recipiente final completándolo con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Aplicar temprano en la mañana, para evitar el viento y la deriva a cultivos vecinos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (litros) (g/ml)	L.M.R. (g/ml)
	Nombre Común	Nombre Científico	L./200 L.	Litros		
Fresa	Ácaro rojo	Tetranychus urticae	0.30 - 0.40	-	1	0.6
Mandarina	Ácaro rojo	Panonychus citri	0.08 - 0.10	-	7	0.3
Palbo	Ácaro rojo	Oligonychus puniceus	0.08 - 0.10	-	30	0.31
Vid	Ácaro rojo	Tetranychus urticae	-	0.8 - 1.0	14	0.6

P.C. Pensado de cosecha
 L.M.R. Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar BRENOM[®] 200 SC al observar los primeros indicios de la plaga, realizando una buena cobertura sobre el follaje. Para el cultivo de mandarina y vid, realizar máximo 01 aplicación por campaña, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo un equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso requiera reingresar al campo antes de cumplir este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: BRENOM[®] 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes coadyuvantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: BRENOM[®] 200 SC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es apto para los usos aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



LOGO PRODUCTO
 LOGO NEOGRUM

ENVASE: PEAD
 PANT. 343 PANT. 377 PANT. 1375

TEXTO
 NEGRO PANT. 293 C

BIOTOXICOLÓGICA

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del GRUPO SILVESTRE



14.5 ± 0.3 cm

2.2 cm