LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Phosphonoglycine

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta; dar de beber abundante agua con sal, y provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con agua y jabón.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL TELÉFONO:
0800-1-3040 (CICOTOX)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMIA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

GLITOX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glyphosate.....480 g/L
(Equivalente a 360 g de ácido glifosato)
Aditivos .....520 g/L

Reg. Nº 988-2000-AG-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO

Formulado por:
ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION
No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou, Zheijang Province, P.R. China.

CIPAGRO S.A.C.
CIENCIA PARA EL AGRO

Importador y distribuidor:
CIPAGRO S.A.C
Calle Las Castañitas N° 138
Urbanización El Palomar San Isidro
ventas@cipagro.com.pe
Teléfono: 464-6854

Contenido Neto: 4 L

Lote Nº:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GENERALIDADES:

GLITOX es un herbicida sistémico, post emergente, no selectivo para el control eficaz de malezas anuales y perennes en caña de azúcar, espárrago, mandarina, palto y vid. **GLITOX** se trasloca dentro de la planta, eliminando partes aéreas, raíces, rizomas, ocasionando la muerte total de las plantas emergidas. **GLITOX** no es persistente en el suelo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

GLITOX se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Aplicar sobre las malezas en crecimiento y suelos húmedos. Evitar contacto con el cultivo; las aplicaciones deben ser dirigidas a las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS: Úsese sólo en los cultivos autorizados.

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre Científico	%	L/ cil 200L	(días)	p.p.m
Caña de azúcar	Coquito	*Cyperus rotundus*	1.5	3	N.A.	N.A.
Espárrago	Grama china Coquito	*Sorghum halepense* *Cyperus rotundus*	1.5	3	N.A.	0.5
Mandarina	Coquito Grama dulce Grama china Amor seco Rabo de zorro Yuyo Cadillo Chamico Verdolaga	*Cyperus rotundus* *Cynodon dactylon* *Sorghum halepense* *Bidens pilosa* *Setaria verticillata* *Amaranthus dubius* *Cenchrus echinatus* *Datura stramonium* *Portulaca oleracea*	1.0	2	N.A.	0.5
Palto			1.0	2	N.A.	N.A.
Vid			1.0	2	N.A.	0.5
Mango			1.0	2 - 3	N.A.	0.2
Limón			1.0	2 - 3	N.A.	0.1

PC: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos **N/A:** No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
La frecuencia se hará según la manifestación y la época de aplicación cuando las malezas presentan crecimiento vigoroso.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingrese a las áreas tratadas durante las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas.

FITOTOXICIDAD:
Afecta el follaje de todas las plantas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO