

16.00 cm

2.00 cm

# Trifmine®

## 30 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable - WP

### COMPOSICIÓN:

Triflumizole.....300 g/Kg  
Aditivos.....c.s.p 1Kg

PQUA N° 1984 - SENASA

Titular del Registro e Importado por:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU  
Av. José Pardo 513 Of. 701 Miraflores. Lima - Perú. Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:

NIPPON SODA CO. LTD

2-1-2 Chome. Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo 100-8165. Japón.

Distribuido por:



CONTENIDO NETO : 100 gramos  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :  
Número de Lote :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

16.00 cm

### “LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Imidazol
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS  
CICOTOX: 0800-13040 (Línea gratuita) o  
ESSALUD: 411-8000 (Anexo 4)

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, inutilice el envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | ENFERMEDAD        |                                             | DOSIS     |       | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-------|----------------|-----------------|
|           | NOMBRE COMUN      | NOMBRE CIENTIFICO                           | g/200 L   | Kg/ha |                |                 |
| Vid       | “Oidiois”         | <i>Erysiphe necator (=Uncinula necator)</i> | 50 - 100  | -     | 14             | 0.5             |
| Alcachofa | “Oidium”          | <i>Leveillula taurica</i>                   | 125       | 0.50  | 3              | 0.1             |
| Pimiento  | “Oidium”          | <i>Leveillula taurica</i>                   | 125 - 150 | -     | 3              | 0.1             |
| Arándano  | “Cabeza de clavo” | <i>Alternaria tenuissima</i>                | 150       | -     | 1              | 0.1             |
| Arroz     | “Sarocladium”     | <i>Sarocladium oryzae</i>                   | 200 - 250 | -     | 30             | 0.1             |

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Periodo de Carencia (días)

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**TRIFMINE 30% PM** es un fungicida del grupo de los imidazoles, inhibidores de la síntesis del ergosterol, con acción preventiva y curativa especialmente formulado para el control de la oidiosis en el cultivo de vid.

**TRIFMINE 30% PM**, tiene una buena acción translaminar (sistémica local) y acción fumigante. Su eficacia no se reduce por la lluvia. Es eficaz en el control de razas resistentes a los fungicidas Benzimidazoles.

**TRIFMINE 30% PM**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

**TRIFMINE 30% PM**, debe ser aplicado en forma preventiva cuando aún no se observen los síntomas de la enfermedad y en forma curativa cuando se manifiestan los síntomas.

#### PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**TRIFMINE 30% PM**, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

#### FITOTOXICIDAD

**TRIFMINE 30% PM**, no presenta síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones en instrucciones dadas”.

