

# GALÁCTICO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES -WG**

Fipronil.....400 g/Kg  
Imidacloprid.....400 g/Kg  
Aditivos.....csp 1 kg

**REG. PQUA N° xxxx-SENASA**

**Contenido Neto: 70 g**

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

TITULAR DEL REGISTRO:  
SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO

Fabricado y formulado por:  
**ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT  
AND EXPORT CORPORATION**  
No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou,  
Zhejiang Province, P.R. China

**DIVISIÓN AGRÍCOLA**  
**Piaggio**  
**EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR**

Importado y Distribuido por:  
SOCIEDAD ANONIMA **Fausto Piaggio**

Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú.  
Teléfono: 464-2222 Fax: 464-2211  
E-mail: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 20100244471



**INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**



**EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO, ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico. Phenylpyrazole + Neonicotinoid
- No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**  
**ESSALUD EN LÍNEA 411- 0800 (opción 4)**  
**CISPROQUIM: 0800-50-847**  
**CICOTOX 0800-13-040**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**  
Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**GALACTICO** es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto. Afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte.

### PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo)

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo 1 aplicación por campaña, y es 1 campaña por año.

### PERIODO DE REINGRESO:

No reingrese al campo, sin ropa protectora, antes de transcurridas 24 horas de realizada la aplicación, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para los cultivos recomendados en la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" CUADRO DE DOSIS Y USOS:

| CULTIVO | ENFERMEDAD   |                      | DOSIS       |      | Periodo de<br>carenia<br>(días) | LMR<br>(ppm)   |
|---------|--------------|----------------------|-------------|------|---------------------------------|----------------|
|         | Nombre común | Nombre científico    | g/cil 200 L | g/ha |                                 |                |
| Cebolla | Thrips       | <i>Thrips tabaci</i> | 200         | 400  | 14*<br>21**                     | 0.02*<br>0.1** |

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

\*Fipronil  
\*\*Imidacloprid

