"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Fipronil.......400 g/Kg Imidacloprid......400 g/Kg Aditivos.....csp 1 kg

REG. PQUA N° 2148-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO

Av. Guillermo Dansey 2045 Cercado de Lima, Perú Telf: 464-2222 Fax: 464-2211 e-mail: ventas@piaggio.com.pe

Fabricado y formulado por: ZHEJIAN CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION

No.37 Qing Chun Road, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China

Importado y Distribuido por:

SOCIEDAD ANONIMA Jausto Piaggio

Av. Guillermo Dansey 2045 Cercado de Lima, Perú Telf: 464-2222 Fax: 464-2211 e-mail: ventas@piaggio.com.pe

Fecha de Formulación: Nº de Lote:

Contenido Neto: **25 Kg** Fecha de Vencimiento:





NO CORROSIVO



EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

Dimensiones: 360 mm x 215 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: - Este producto es DAÑINO, ingerir.

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: Grupo Químico. Phenylpyrazole + Neonicotinoid No tiene antídoto especifico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO 464-2222

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
 No aplicar en época de floración del cultivo.
 No aplicar en presencia de polinizadores.
 Peligroso para organismos acuáticos.

- Peligroso para organismos acualicos.
 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.
 El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

modo y mecanismo de acción:

GALACTICO es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto. Afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte.

modo de empleo:

La preparación y aplicación de GALACTICO se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo.

"CONSULTE CON UNINGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		Periodo de carencia	LMR
	Nombre común	Nombre científico	g/cil 200 L	g/ha	(días)	(ppm)
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	200	400	21	0.02* 0.1**
Pimiento	Caracha (mosquilla de los brotes)	Prodiplosis longifila	100	200	35	0.005* 1**

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar máximo 1 aplicación por campaña, y es 1 campaña por año.

PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO):

No reingrese al campo, sin ropa protectora, antes de transcurridas 24 horas de realizada la aplicación, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para los cultivos recomendados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.





















Dimensiones: 360 mm x 215 mm

^{*}Fipronil

^{**}Imidacloprid