

21.5 ± 0.3 cm

0.7 ± 0.2

0.3 ± 0.2

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DÁNINO. NO INGERIR.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Piretroides**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta o la hoja informativa.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral, si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

SAMU: 106

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:

NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-64007

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



CAMPAL® 250CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Cypermethrin..... 250 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2152 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla.
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido Neto: 500 ml

N° Lote:
F. de Form.: " ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
BELIN INTERNATIONAL LTD.
Suite 605, 6/F, China Insurance Group Building,
141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DÁNINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAMPAL® 250 CE es un insecticida piretroides de amplio espectro de acción que actúa por contacto e ingestión. Debido a sus efectos insecticidas, mata posturas por contacto y las larvas por contacto e ingestión.

CAMPAL® 250 CE no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla pero, para formar una mejor solución conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, agitar bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200L	L/ha		
Alcachofa	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	200	0.4	15	2
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	150 - 200	0.3 - 0.4	14	0
	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	150 - 300	0.1 - 0.3		
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	200	-	7	0.01
Espárrago	Gusano del follaje	<i>Copitarsia corruda</i>	250	0.5	15	0.4
Palto	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	200	1.0		
	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	300	1.5	7	0.05
	Trips del palto	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	250	1.25		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100 - 166	0.3 - 0.5	12	0.01
Pimiento	Gusano Peforador de frutos	<i>Heliothis virescens</i>	200	0.4	2	0.5
	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	250	0.5		
Tomate	Oruga minadora de hoja y tallo	<i>Tuta absoluta</i>	100 - 125	0.4 - 0.5	12	0.2

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: La aplicación se determinará de acuerdo al estado fenológico del cultivo, la presencia de plaga y las condiciones ambientales. Se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



11.0 ± 0.3 cm

1.65 cm