


**ETIQUETA**

BUKRA 580 WG - NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.

Revisión: 00
Aprobado: JR
Fecha: 17-01-18
Página: 3 de 5



Medidas en cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- [illegible]

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pírex y Benzoflona**
- Indicaciones:** Se recomienda su uso en el tratamiento inmediato o preventivo del paciente alérgico y muéstrale la etiqueta.
- Contraindicaciones:** No utilizar en la presencia de cualquier complicación.
- Precauciones:** En caso de ingesta, no inducir vómito ni administrar nada por boca.
- Interacciones:** No utilizar en pacientes que estén recibiendo otros medicamentos.
- Condiciones de uso:** En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua por la menos 15 minutos.
- Forma de uso:** Se debe utilizar en la forma indicada en los preparados antes levantados. Retirar los restos de contacto al borrar.
- Condiciones de conservación:** En caso de contacto con la piel, retirar la piel y calzado contaminado.
- Condiciones de almacenamiento:** Guardar en su envase original y a temperatura ambiente.
- Condiciones de empaque:** Se recomienda la aplicación del producto cuando se tenga presencia de la plaga.
- PERIODO DE REINGRESO**
- Debe reingresar al campo sin el uso de protección 24 horas después de haber terminado la aplicación. Si se requiere que el paciente, o persona antes de salir, se bañe, se recomienda la aplicación del producto cuando se tenga presencia de la plaga.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- COMPATIBILIDAD**
BUKAR 580 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, siempre que no se mezclen con plaguicidas que contengan: **ESSALUD: 411 8000 (opción 4)**
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE

- | | | |
|-----------------|--|--|
| AMBIENTE | <p>• Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.</p> <p>• No aplicar en época de floración de cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores.</p> <p>• No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.</p> <p>• Aplicar temprano en las mañana o muy en las tarde. Evitar la deriva por el viento.</p> <p>• Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.</p> <p>• Peligroso para organismos acuáticos.</p> | <p>El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.</p> |
|-----------------|--|--|

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas de producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L		
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1 - 0.2	28	(*) 0.02 (**) 0.05

PC: Periodo de Carenzia (días)

(*) Chlorfenapyr

(**) Lufenuron

LMR: Limite Máximo de Resíduos

