

VOLTIN[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor ó nebulización).
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piréroides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo con los párpados abiertos.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: llevar al paciente a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de Emergencias llamar a:

CIGOTOX Telf.: 0-800-13040 (atención 24 horas) o
ESSALUD Telf.: 0-801-10200
DROKASA PERU S.A. Telf.: (01) 501-1000

- NOTA AL MÉDICO: Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y otros insectos beneficiosos.
- No aplicar en época de floración y en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



INDICACIONES DE USO Y MANEJO

GALGOTRIN, es un insecticida a base de Cypermethrin que actúa por contacto e ingestión, de amplio espectro de acción, usado para el control de insectos plagas de los cultivos agrícolas.

GALGOTRIN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	NOMBRE COMÚN	PLAGAS	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	PC (Días)	LMR (ppm)
PAPA	Mosca minadora	Pulga	Litomyza huachirensis	0.4 - 0.5	12	1.5
	Pulga		Tuta absoluta	0.4 - 0.5	12	1.5
	Gusano pasado		Pachynotus peruviana	0.4 - 0.5	12	2.0
ALGODÓN	Artrópodo	Gusano mayor de la hoja	Dioscorea peruviana	0.4 - 0.5	12	2.0
	Gusano mayor de la hoja		Alabama argillacea	0.2 - 0.3	12	2.0
	Perforador de bellotas		Hebea areolaris	0.2 - 0.4	12	2.0
TOMATE	Mosca minadora	Pulga	Litomyza huachirensis	0.4 - 0.5	12	0.5
	Tuta absoluta		Tuta absoluta	0.4 - 0.5	12	0.5
	Gusano ejido		Spodoptera eridania	0.2 - 0.4	12	0.5
CEBOLLA	Tipo	Cabalilla	Thrips tabaci	0.3 - 0.4	15	0.5
	Cabalilla		Anthonomus granatella	0.3 - 0.4	12	0.5
SORGO	Mosquito del ovario del sorgo	Cabalilla	Contarinia setigera	0.3 - 0.4	12	1.5
	Barrido de insectos y vellos		Epilachna sp.	0.3 - 0.4	12	1.0
SOYA	Cabalilla	Pulga	Anthonomus granatella	0.3 - 0.4	12	1.0
	Pulga de la mancha		Cydia pomonella	0.3 - 0.4	15	0.5
MANZANO	Mosca minadora	Pulga	Litomyza huachirensis	0.4 - 0.5	NA	0.1
	Mosca minadora		Litomyza huachirensis	0.4 - 0.5	NA	2.0
ALCACHOFA	Mosca minadora	Pulga	Litomyza huachirensis	0.4 - 0.5	NA	NA
	Mosca minadora		Litomyza huachirensis	0.4 - 0.5	NA	NA
HOLANDA	Tipo	Cabalilla	Thrips tabaci	0.3 - 0.4	15	0.5
	Gusano del tallo		Cydia pomonella	0.3 - 0.4	15	0.5
ESPARRAGO	Tipo	Cabalilla	Thrips tabaci	0.3 - 0.4	15	0.5
	Tipo		Thrips tabaci	0.3 - 0.4	15	0.5

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Repetir la aplicación cada 7 - 14 días, dependiendo de la infestación de la plaga. Realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GALGOTRIN, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si se inhala. Evite respirar (polvo, vapor ó aspersión).
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- En caso de ingestión: no dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos, permaneciendo con los párpados abiertos.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: llevar al paciente a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de Emergencias llamar a:

CICOTOX Tel.: 0-800-13040 (atención 24 horas) o
ESSALUD Tel.: 0-801-10200
DROKASA PERU S.A. Tel.: (01) 501-1000

- **NOTA AL MÉDICO:** Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración y en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques ó arroyos con los desechos ó envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades leales para este fin.

VOTRIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:

Cypermethrin.....250 g/L
Aditivos c.s.p.....1L

Reg. PQUA Nº -SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar.
Lima - Perú. Tel.: 501-1000

FORMULADO POR: CHEMOTECNICA S.A.

Cno. Real Esq. Marconi, Ruta 205 Km. 43.5 # 1813 C.
Spegazzini, Poja. Bs. As. Argentina

REENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt. B y Sub Lote,
Parcela 64, Lt.B. Lurigancho - Chosica - Lima

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERU S.A.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 10 Litros

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

GALGOTRIN, es un insecticida a base de Cypermethrin que actúa por contacto e ingestión, de amplio espectro de acción, usado para el control de insectos plagas de los cultivos agrícolas.

GALGOTRIN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua. Luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	NOMBRE COMÚN	PLAGAS	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	PC (Días)	LMR (ppm)
PAPA	Mucha ramada	Liriomyza huidobrensis	Liriomyza huidobrensis	0.4-0.5	12	15
	Pollito	Tuta absoluta	Tuta absoluta	0.4-0.5	12	1.0
	Quema ramada	Phthorimaea operculella	Phthorimaea operculella	0.4-0.5	12	2.0
	Arrozado	Dioscorea peruviana	Dioscorea peruviana	0.4-0.5	12	2.0
ALGODÓN	Quema mayor de la hoja	Aphis gossypii	Aphis gossypii	0.2-0.3	12	2.0
	Perforador de hojuelas	Plutella maculipennis	Plutella maculipennis	0.3-0.4	12	2.0
TOMATE	Mucha ramada	Liriomyza huidobrensis	Liriomyza huidobrensis	0.4-0.5	12	0.5
	Pollito	Tuta absoluta	Tuta absoluta	0.4-0.5	12	0.5
	Quema ojalado	Spodoptera eridania	Spodoptera eridania	0.3-0.4	12	0.5
CEBOLLA	Trips	Trips tabaci	Trips tabaci	0.3-0.4	15	0.5
	Caballito	Aphis gossypii	Aphis gossypii	0.3-0.4	12	0.5
ALFALFA	Manejo del ovillo del negro	Contarinia medagana	Contarinia medagana	0.3-0.4	12	1.6
	Barrido de brotes y vides	Epilachna variegata	Epilachna variegata	0.3-0.4	12	1.0
SOYA	Caballito	Aphis gossypii	Aphis gossypii	0.3-0.4	12	1.0
	Pollito de la manzana	Cydia pomonella	Cydia pomonella	0.3-0.4	15	0.5
PAPAYA	Mucha ramada	Liriomyza huidobrensis	Liriomyza huidobrensis	0.4-0.5	NA	0.1
	Mucha ramada	Liriomyza huidobrensis	Liriomyza huidobrensis	0.4-0.5	NA	2.0
ALCACHOFA	Mucha ramada	Liriomyza huidobrensis	Liriomyza huidobrensis	0.4-0.5	NA	NA
	Mucha ramada	Liriomyza huidobrensis	Liriomyza huidobrensis	0.4-0.5	NA	NA
HOLANTAO	Trips	Trips tabaci	Trips tabaci	1.3-1.5	NA	0.06
	Quema del follaje	Coplatra cornuta	Coplatra cornuta	0.5-0.5	15	0.1
ESPÁRRAGO	Trips	Trips tabaci	Trips tabaci	0.3-0.4	15	0.5
	Trips	Trips tabaci	Trips tabaci	0.3-0.4	15	0.5

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Repetir la aplicación cada 7 - 14 días, dependiendo de la infestación de la plaga. Realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GALGOTRIN, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si se inhala. Evite respirar (polvo, vapor ó aspersión).
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Pirrotioles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos, permaneciendo con los párpados abiertos.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: llevar al paciente a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX Tel.: 0-800-13040 (atención 24 horas) o
ESSALUD Tel.: 0-801-10200
DROKASA PERU S.A. Tel.: (01) 501-1000

- NOTA AL MÉDICO: Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración y en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques ó arroyos con los desechos ó envases vacíos.
- Resguardar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

VOLTRIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:

Cypermethrin.....250 g/L
Activos c.s.p.....1L

Reg. PQUA Nº -SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Marschal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar.
Lima - Perú. Tel.: 501-1000

FORMULADO POR: CHEMOTECNICA S.A.

Cno. Real Esq. Marconi, Ruta 205 Km. 43.5 # 1813 C.
Spegazzini, Poja. Bs. As. Argentina

REENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt. B y Sub Lote,
Parcela 64, Lt. B. Lurigancho - Chosica - Lima

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERU S.A.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 20 Litros



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INDICACIONES DE USO Y MANEJO

GALGOTRIN, es un insecticida a base de Cypermethrin que actúa por contacto e ingestión, de amplio espectro de acción, usado para el control de insectos plagas de los cultivos agrícolas.

GALGOTRIN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua. Luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	NOMBRE COMÚN	PLAGAS		DOSIS L/ha	PC (Días)	LMR (ppm)
		NOMBRE CIENTÍFICO				
PAPA	Mosca ramadora	Liriomyza huidobrensis		0.4-0.6	12	1.5
	Polilla	Puta absoluta		0.4-0.6	12	1.5
	Quemado	Peronospora sp.		0.4-0.6	12	2.0
	Quemado mayor de la hoja	Abiesia angulata		0.4-0.6	12	2.0
	Perforador de bellotas	Heliothis virescens		0.3-0.4	12	2.0
TOMATE	Mosca ramadora	Liriomyza huidobrensis		0.4-0.6	12	0.5
	Polilla	Tuta absoluta		0.4-0.6	12	0.5
	Quemado y el otro	Spodoptera eridania		0.3-0.4	12	0.5
CEBOLLA	Trips	Trips tabaci		0.3-0.4	15	0.5
	Caballito	Aphis gossypii		0.3-0.4	12	0.5
ALFALFA	Mosquito del avío del negro	Contarinia medicaginis		0.3-0.4	12	1.5
	Barrenador de brotes y vientos	Epilachna sp.		0.3-0.4	12	1.0
SORGO	Caballito	Aphis gossypii		0.3-0.4	12	1.0
	Polilla de la manzana	Cydia pomonella		0.3-0.4	15	0.5
MANIZANO	Mosca ramadora	Liriomyza huidobrensis		0.4-0.6	12	0.1
	Mosca ramadora	Liriomyza huidobrensis		0.4-0.6	12	0.1
ALCACHOFA	Mosca ramadora	Liriomyza huidobrensis		0.4-0.6	12	0.1
	Mosca ramadora	Liriomyza huidobrensis		0.4-0.6	12	0.1
HOLANTAO	Trips	Trips tabaci		0.3-0.4	15	0.5
	Quemado del follaje	Peronospora sp.		0.3-0.4	15	0.5
PALTO	Trips	Trips tabaci		0.3-0.4	15	0.5
	Quemado del follaje	Peronospora sp.		0.3-0.4	15	0.5
ESPÁRRAGO	Trips	Trips tabaci		0.3-0.4	15	0.5
	Quemado del follaje	Peronospora sp.		0.3-0.4	15	0.5
AJOS	Trips	Trips tabaci		0.3-0.4	15	0.5
	Quemado del follaje	Peronospora sp.		0.3-0.4	15	0.5

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Repetir la aplicación cada 7 - 14 días, dependiendo de la infestación de la plaga. Realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GALGOTRIN, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Este producto es dañino, no ingerir.

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor ó aspersión).
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo químico: Piretroides
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos, permaneciendo con los párpados abiertos.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: llevar al paciente a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de Emergencias llamar a:

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

- Peligroso para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración y en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.

- No contaminar ríos, estanques ó arroyos con los desechos ó envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades leales para este fin.

Concentrado Emulsionable - EC

Cypermethrin.....250 g/L
Aditivos c.s.p.....il

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar. DROKASA
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

Cno. Real Esq. Marconi, Ruta 205 Km. 43.5 # 1813 C.
Spegazzini, Pcia. Bs. As. Argentina

Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt. B y Sub Lote, Parcela 64, Lt B. Lurigiancho - Chosica - Lima

CONTENIDO NETO: 200 Litros

Número de Lote	:
Fecha de Formulación	:
Fecha de Vencimiento	:



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

GALGOTRIIN, es un insecticida a base de Cypermethrin que actúa por contacto e ingestión, de amplio espectro de acción, usado para el control de insectos plagas de los cultivos agrícolas.

GALGOTRIN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se eleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS		PLAGAS		DOSIS	PC (días)	LMW (ppm)
NOMBRE COMÚN		NOMBRE CIENTÍFICO		Litro		
PAPA	Mezcla invasora	Mezcla invasora	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.4 - 0.5	12	15
	Pollín	Pollín	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.4 - 0.5	12	15
	Guano	Guano	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.4 - 0.5	12	20
ALGODÓN	Arácnido	Arácnido	<i>Diplosoma dorsalis</i>	0.4 - 0.5	12	20
	Guano mayor de la hoja	Guano mayor de la hoja	<i>Alibania angulosa</i>	0.2 - 0.3	12	20
	Perforador de bellotas	Perforador de bellotas	<i>Alibania virens</i>	0.3 - 0.4	12	20
TOMATE	Mezcla invasora	Mezcla invasora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.4 - 0.5	12	0.5
	Pollín	Pollín	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.4 - 0.5	12	0.5
	Guano eflores	Guano eflores	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.3 - 0.4	12	0.5
CEBOLLA	Tripe	Tripe	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.3 - 0.4	15	0.5
	Caballito	Caballito	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.3 - 0.4	12	0.5
	Monquillo del ovino del sorgo	Monquillo del ovino del sorgo	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.3 - 0.4	12	15
SORGO	Barrenador de brotes y vástros	Barrenador de brotes y vástros	<i>Epiphyas virescens</i>	0.3 - 0.4	12	1.0
	Caballito	Caballito	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.3 - 0.4	12	1.0
	Pollín de la manzanilla	Pollín de la manzanilla	<i>Cyclotoma punctata</i>	0.3 - 0.4	15	0.5
MANZANO	Mezcla invasora	Mezcla invasora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.4 - 0.5	NA	0.1
	Mezcla invasora	Mezcla invasora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.4 - 0.5	NA	2.0
	Mezcla invasora	Mezcla invasora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.4 - 0.5	NA	NA
ALCAHOFA	Mezcla invasora	Mezcla invasora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.4 - 0.5	NA	NA
	Mezcla invasora	Mezcla invasora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.4 - 0.5	NA	NA
	Mezcla invasora	Mezcla invasora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.4 - 0.5	NA	NA
HOLANTO	Tripe	Tripe	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	1.0 - 1.5	NA	0.05
	Pollín	Pollín	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.5 - 0.6	15	0.1
	Guano del colaje	Guano del colaje	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.3 - 0.4	15	0.5
ESPÁRAGO	Tripe	Tripe	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.3 - 0.4	15	0.5
	Tripe	Tripe	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.3 - 0.4	15	0.5
	Tripe	Tripe	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.3 - 0.4	15	0.5

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Repitr la aplicaci3n cada 7 - 14 das, dependiendo de la infestaci3n de la plaga. Realizar 2 aplicaciones por campaa.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GALGOTRIN, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"



001

55

