

Strobly® DF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSITION:
Kresoxim methyl 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1/kg

Req. PQUA N° 2164-SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO
POR:**

BASF Peruana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915 –
Callao. Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519

BASF
We create chemistry

FORMULADO POR:
BASF Societas Europaea
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen
Alemania

CONTENIDO NETO: 1 kg

Nº de Lote
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO

® = Marca Registrada BASF

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

072

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Strobý[®]DF inhibe la respiración mitocondrial de los hongos y con ello su fuente de energía, debido a su alta afinidad a la superficie cerosa de las hojas y su baja presión de vapor. Strobý[®]DF permanece durante un tiempo prolongado controlando diferentes hongos que atacan los cultivos, descritos en el cuadro adjunto. Kresoxim metil pertenece al Código FRAC 11.

Stroby®DF, se aplica disuelto en agua, se llena un tercio del depósito a usar con agua, se agrega la cantidad respectiva del producto y se completa la capacidad del recipiente con agua, después de una ligera agitación se tiene una mezcla homogénea.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC* (días)	L.M.R.** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	g/ha	g/200 L		
Alcachofa	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	200 - 300	80 - 100	N.A.	0.05
Cebolla	Punta seca	<i>Sternophyllum vesicarium</i>	250 - 300	100 - 140	N.A.	0.05
Durazno	Oidiois	<i>Sphaeroteca pannosa</i>	200-300	40-60	30	0.05
Esparángo	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	300	80-100	N.A.	0.05
Fresas	Mancha púrpura	<i>Sternophyllum vesicarium</i>	200 - 250	70 - 100	21	0.05
	Oidiois	<i>Oidium sp</i>				
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200-300	80 - 100	N.A.	1
Mandarinal	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	30 - 45	N.A.	0.05
Mango	Oidiois	<i>Oidium mangiferae</i>	200	40	N.A.	0.05
Manzano	Oidiois	<i>Podosphaera leucotricha</i>	200-300	40 - 60	30	0.2
Pallo	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	30 - 45	N.A.	0.05
Pimiento	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	200 - 300	80 - 100	3	1
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 250	70 - 100	3	1
Rosas	Oidiois	<i>Sphaeroteca pannosa</i>	200-300	40 - 60	N.A.	N.A.
Vid	Oidiois	<i>Erisiphe necator</i>	300	40 - 60	14	1

* PC = Período de carencia.

N.A. = No aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Strob®DF debe ser aplicado en forma preventiva. Se recomienda realizar como máximo dos aplicaciones de Strob®DF en intervalo de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar a las áreas tratadas antes de 12 horas de realizado el tratamiento.

COMPATIBILIDAD: Strobry®DF no es compatible con productos marcadamente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados siguiendo las instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"