

18x 24

VITALAXYL

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Cymoxanil.....80 g/Kg.
Mancozeb.....640 g/Kg.
Aditivos.....c.s.p. 1 kg.

PQUA N° 2158 - SENASA

Titular del Registro, importador y distribuidor:

PERÚ PRODUCTOS AGRICOLAS SAC

RUC: 20530897983

Calle E. Nerini N° 711. Dpto. 204. Urb. El Pino.

Lima - Lima - San Luis



FORMULADO POR:

AGRO-CARE CHEMICAL INDUSTRY GROUP LIMITED

343 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province,

Telef: 0086-510-82791479

P.R. CHINA

Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :
Lote N° :
Contenido neto : 1 Kg.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"Mantengase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Tóxico por ingestión, puede provocar vómitos, diarrea y espasmos.
- Moderadamente irritante a los ojos.
- Peligroso si es inhalado.
- Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.
- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas de uso humano o animal.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Ditiocarbamato (Mancozeb) y Acetamidas (Cymoxanil).

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Ayuda básica, descontaminación y tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, provoquese el vómito, siempre que el paciente este consciente.
- No tiene antidotos específicos.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:
CICOTOX: 0-800-1-3040
ESSALUD: 472-2300 (Lima)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No re-utilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- VITALAXYL es un fungicida sistémico de amplio espectro y acción múltiple, que previene y cura una diversidad de enfermedades fungosas del Orden Peronosperales.
- VITALAXYL es un antiesporulante que no es lavado por la lluvia al penetrar rápidamente a la planta.
- VITALAXYL tiene doble acción previene la enfermedad al formar una barrera sobre la superficie de la planta impidiendo la germinación de las esporas y en el interior de la planta evita la esporulación, cura y erradica al hongo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad y repetir cuando sea necesario hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

- 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

- Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

- No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.
- Se puede emplear en todos los estados de desarrollo de la planta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

- El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (KG)		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Por 200 L. de agua	Por Ha.		
Papa	"Rancha" ó "Hielo fungoso"	Phytophthora infestans	0.5	1.5 - 2.0	14	0.05 (Cymoxanil) 0.2 (Mancozeb)

L.M.R. = Limite Maximo de Residuos | P.C.: Periodo de Carencia

