14,8

14,8

14,8

19,9

3,0

TIEZO® 300 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

**Composición:**

Thiamethoxan : 250 g/kg
Emamectin benzoate : 50 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA Nº 2177 - SENASA**

Silvestre

**Titular del Registro:**
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

**Importado y Distribuido por:**
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Contenido Neto: 1 kg** (10 bolsas de 100 g)
Nº de Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

**Formulado por:**
**NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.**
8 South Liyuan Road, Jiangning District,
Nanjing, China.

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- **Grupo Químico: Thiamethoxan: Neonicotinoide, Emamectin benzoate: Avermectin**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**SAMU: 106**
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300**

TIEZO® 300 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

Gránulos Dispersables (WG)

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**TIEZO® 300 WG** es un insecticida que combina la acción de dos ingredientes activos: Thiamethoxan, presenta una actividad translaminar y sistemática, que actúa por contacto e ingestión a nivel del sistema nervioso de los insectos y su actividad alcanza a las raíces, hojas y tallos; y Emamectin benzoate actúa por contacto e ingestión, no sistémico, con efecto translaminar. **TIEZO® 300 WG** puede usarse para el control de la "Mosquillas de los brotes", en el cultivo de espárrago.
**TIEZO® 300 WG** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS kg/200L | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | | | |
| ARROZ | Cigarrita del virus de la hoja blanca | *Sogatodes orizicolus* | 0.08 - 0.15 | 20 | (1) 0.01 (2) 0.01 |
| ESPÁRRAGO | Mosquilla de los brotes | *Prodiplosis longifila* | 0.1 - 0.2 | 7 | (1) 0.05 (2) 0.01 |
| MAIZ | Gusano cogollero | *Spodoptera frugiperda* | 0.1 - 0.2 | 31 | (1) 0.05 (2) 0.01 |
| PIMIENTO | Mosquilla de los brotes | *Prodiplosis longifila* | 0.1 - 0.2 | 3 | (1) 0.7 (2) 0.02 |

**P.C.:** Periodo de Carencia (1) Thiamethoxan (2) Emamectin benzoate **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo, realizar 1 aplicación por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**
**TIEZO® 300 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con ácidos, agentes oxidantes, bases fuertes y aguas con carbonatos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Medidas en cm.

ENVASE: Caja de cartón.