



ETIQUETA
TIEZO 300 WG - NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.

Revisión: 00
Aprobado: JR
Fecha:
Página: 6 de 6

30.0 ± 0,3 cm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS"**

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
 - Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
 - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
Grupo Químico: Thiamethoxan, Neonicoínido, Emamectin benzoate, Avermectin
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilice el triángulo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG
Composición:
Thiamethoxan : 250 g/kg
Emamectin benzoate : 50 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° XXX - SENASA



Titular de Registro: Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C. **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores,
Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 617-3300.

Contenido Neto: **25 kg**
Formulado por:
F. de Form: **NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.**
N° Lote: **8 South Liyuan road Jiangning Dis.**
F. de Venc: **Nanjing 211100, China**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

- INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
- **TIEZO® 300 WG** es un insecticida que combina la acción de dos ingredientes activos: Thiamethoxan, presenta una actividad translocar y sistémica, que actúa por contacto e ingestión a nivel del sistema nervioso de los insectos y su actividad alcanza a las raíces, hojas y tallos; y Emamectin benzoate actúa por contacto e ingestión, no sistémico, con efecto translocar. Para el control de la "Mosquillas de los brotes", en el cultivo de espárrago.
 - **TIEZO® 300 WG** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc) que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/20L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ESPÁRRAGO	"Mosquilla de los brotes"	Prodoxipus longitarsis	0.1 - 0.2	7	0.05 (1) 0.01 (2)

PC: Periodo de Curación (1) Thiamethoxan (2) Emamectin benzoate LMR: Límite Máximo de Residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se deberá evaluar la incidencia de la enfermedad y las condiciones óptimas de su desarrollo, realizar 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD
TIEZO® 300 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con ácidos, agentes oxidantes, bases fuertes y aguas con carbonatos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
TIEZO® 300 WG no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

23.0 ± 0.3 cm

3.3 ± 0.2



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



TEXTO LOGO TIEZO: C:0 M:0 Y:0 K:80
L. SILVESTRE L. TRIPLE LAVADO: PANTONE 343 C
B. TOXICOLÓGICA GOTA TRIPLE LAVADO: PANTONE 293 C
L. TIEZO: PANTONE 357 C

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE